

**Hastaya Pozisyon Ver (Hasta sedyeye oturtulur)****Oksijen (6-8 lt/dk)****Monitörizasyon****Morfin (2-3 mg iv)(KOAHA, Astım, Kor pulmonale de Sol.Depresyonu Yapabilir)****Diüretik (furosemid) 40-80 mg iv, idamesi infüzyon****Aminofilin - bronkodilatatör, renal kan akım artırıcı, diüretik etkisi, (+) inotrop etkisi, venodilatatör olarak (6 mg/kg yükleme(20 dk), devamında 0.6 mg/kg/saat infüzyon)**

Hasta Hipertansif ise;

Nitrogliserin -koroner vazodilatatör olarak (10 mikrogram/kg/dk)**Nitroprussid- arterial-venöz dilatatör olarak (0.5-1 mikrogram/kg/dk)**

Hasta Hipotansif ise;

Dopamin (2-20 mikrogram/kg/dk)**Dobutamin (2-20 mikrogram/kg/dk)**

Kardiyoloji ve/veya Anestezi konsültasyonu

Solunum sıkıntısı düzelmediyse;

Gerekliyorsa **CVAP**Gerekliyorsa **Entübasyon** ve **Mekanik ventilasyon**
(PCO₂>60, PO₂<60 PH<7.2, Bilinç bozukluğu varsa)

Servise/yoğun bakıma yatış.

Ya da sevk işlemi.