



Doküman Kodu: HB.FR.027

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 2

Tarih:						Yaşı:					
Hastanın Adı Soyadı/Cinsiyeti:						Yattığı Bölüm:					
Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği	
Parametreler	Risk Faktörleri						Puan	İlk Değ.	Yeniden Değ.		
								
YAŞ	60-69						1	1	1	1	
	70-79						2	2	2	2	
	80 ve üstü						3	3	3	3	
BİLİNÇ DURUMU	Bilinci kapalı.						1	1	1	1	
	Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)						2	2	2	2	
DÜŞME HİKAYESİ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.						3	3	3	3	
HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet,artrit, osteoporoz, kırıklar)	Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır.						1	1	1	1	
	Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.						2	2	2	2	
HAREKET KABİLİYETİ	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.						5	5	5	5	
	Ayakta/yürürken denge bozukluğu var.						10	10	10	10	
	Baş dönmesi var.						2	2	2	2	
BOŞALTIM İHTİYACI	Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.						1	1	1	1	
GÖRME DURUMU	Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)						2	2	2	2	
	İleri derecede görme engeli var.						10	10	10	10	
İLAÇ KULLANIMI	4'den fazla ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	
	Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	
	Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.						3	3	3	3	
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.)	Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.						1	1	1	1	
	Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.						2	2	2	2	
TOPLAM											

RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU: Düşük Risk0-9 Puan Arasında

Yüksek Risk 10 Puan Üzerinde



Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:.....İmza:

NOT:* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir. * İtakî Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır. * Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.