



Tarih/ Risk Değerlendirme Tarihi:			Hastanın Yaşı:						
Hastanın Adı Soyadı:			Servis Adı:						
Değerlendirme Gerekçesi	1.İlk değerlendirme 2.post op dönem 3.Hasta Düşmesi 4.Bölüm değişikliği 5.Durum Değişikliği		İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih-Gerekçe Numarası)					
Parametreler	Risk Faktörleri		Puan	.../.../20..	.../.../20..	.../.../20..	.../.../20..	.../.../20..	.../.../20..
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
YAŞ	0-3 yaş		4	4	4	4	4	4	4
	4-7 yaş		3	3	3	3	3	3	3
	8-11 yaş		2	2	2	2	2	2	2
	12-18 yaş		1	1	1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.		2	2	2	2	2	2	2
HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge Bozukluğu, Kooperasyon Bozukluğu, Solunum Hastalıkları, Senkop/Baş Dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.		1	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.		2	2	2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)		2	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.		10	10	10	10	10	10	10
İLAC (Hiptonik, Barbitürat, Nöroleptik, Antidepresan, Sedatif, Antihipertansif)	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.		2	2	2	2	2	2	2
EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Katater, Dren vb.)	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.		2	2	2	2	2	2	2
YÜRÜME VE DENGE (Yürüteç, Koltuk Değneği, Kişi Desteği vb.)	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.		10	10	10	10	10	10	10
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde		3	3	3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde		1	1	1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb.)		3	3	3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil		3	3	3	3	3	3	3
DİĞER	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.		2	2	2	2	2	2	2
	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.		2	2	2	2	2	2	2
RİSK BELİRLEME TABLOSU	TOPLAM PUAN								
Düşük Risk 0-9 Arası, Yüksek Risk 10 Puan ve üzeri	Değerlendirmeyi Yapan Hemşire Adı Soyadı: İmza:								



NOT:

- *Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.
- *Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.
- *Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Riski Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.