



Gösterge Kodu	HSTN.GKG48
Tanım	İlgili dönemde, vajinal doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade eder.
Amaç	Vajinal doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilerek, olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılması amaçlanmaktadır.
Veri Kaynağı	Hasta Kayıtları
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanan hasta sayısı/VTE yönünden riskli olan ve vajinal doğum yapan toplam hasta sayısı) x 100
Alt Göstergeler	Hekim bazında vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı
Hedef Değer	Yıllık analizler sonucu kurumsal olarak belirlenecektir.
Veri Giriş Periyodu	3'er aylık
Sorumlular	Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları
Açıklama	VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ: o Antenatal dönemde toplam puan ≥ 4 ise 1.trimesterden itibaren tromboprofilaksi önerilir. o Antenatal dönemde toplam puan 3 ise 28. gebelik haftasından itibaren tromboproflaksi önerilir. o Postnatal dönemde toplam puan ≥ 2 en az 10 gün süreyle tromboproflaksi önerilir. o Antenatal dönemde hastaneye yatış durumunda tromboproflaksi önerilir. o Puerperium döneminde hastanede uzun yatış (≥ 3 gün) veya tekrar hastaneye yatış durumunda tromboproflaksi önerilir. Venöz Tromboemboli (VTE) için Risk Faktörleri Puanlaması için Bkz: Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi