



- AMAÇ:** Ekstravazasyon sonucu gelişen doku hasarının her aşamasında iyileşme sürecini hızlandırmak ve doku bütünlüğünü yeniden sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.
- KAPSAM:** Ekstravazasyon oluşumundan sonraki ilk 60 dakikanın sonundan başlar, yara iyileşmesi sağlanıncaya kadar süren faaliyetleri kapsar.
- SORUMLULAR:** Doktor, servis/ünite hemşiresi.
- TANIMLAR**

- Ekstravazasyon:** Damar yolunun açıldığı alanda vezikant veya irritant ilaçların sızması sonucunda ağrı ya da nekroz olmasına denir.
- Ülserasyon:** Deri ve mukoza yüzeyinde doku kaybı sonucu ortaya çıkan lezyonlardır.
- Nekroz:** Canlı bir organizmada hücre ve dokunun patolojik ölümüne nekroz denir.

5. UYARILAR ve ÖNERİLER:

- Ekstravazasyon iyileşme süreci; doku hasarı gelişen bölgede, kızarıklık, ülserasyon, enfeksiyon, nekroz ve ağrının varlığı yönünde değerlendirilmelidir.

6. ARAÇ ve GEREÇLER:

- Sıcak/soğuk kompres
- Non-steril eldiven
- Yara bakım pansuman malzemeleri

7. UYGULAMA:

- İşlem öncesi hasta ve hasta yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilir.
- Eller “**El Hijyeni Talimatına**” göre yıkanır.
- Eldiven giyilir.
- Ekstravaze bölgeye doktor orderine göre ekstravaze ilacın cinsine uygun sıcak ya da soğuk uygulama yapılır.
- Ekstravaze olan ekstremitelere ilk 48 saat kalp seviyesinin üzerine elevasyona alınır.
- Ekstravaze bölge kızarıklık, ağrı, ülserasyon, enfeksiyon, nekroz açısından 24 saat aralarla kontrol edilir.
- Ekstravaze bölgede ülserasyon geliştiğinde uygun bakım yapılır.
- Atıklar “**Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı**” na uygun şekilde atılır.
- Eller “**El Hijyeni Talimatı**” na uygun yıkanır.
- Yapılan işlem “**Hemşire Gözlem Formu**” na kaydedilir.

İlgili Dokümanlar:

- Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı
- El Hijyeni Talimatı
- Hemşire Gözlem Formu