



ABC, damar yolu, oksijen, monitörizasyon

Bilinç durumu değişmiş hastalarda; Oksijen, Naloksan (0, 4-2 mg iv), Tiamin (100 mg), glukoz (% 50 dekstrozdandan 50 mL).

Nöbet durumunda; Benzodiazepin, Fenobarbital

Ajite hastalarda; kısa etkili benzodiazepinler, haloperidol

Yüzey dekontaminasyon; hasta tamamen soyulur ve bol su ile yıkanır.

Göz lavajı; göze temas mevcutsa yapılır.

Gastrik lavaj; alımdan 1 saat içinde gelen hastalara yararlıdır.

Aktif kömür; (1 mg/kg)

Osmotik katartikler;(%70 lik sorbitolden 1 gr/kg veya %10'luk magnezyum sitrattan 4 mg/kg aktif kömürle birlikte gastrointestinal geçişi hızlandırmak için verilebilir.

Spesifik antidot tedavisi;

Eliminasyonun artırılması; (idrar alkalinizasyonu, hemoperfüzyon veya hemodiyaliz)

Anestezi, Dahiliye ve/veya, ilgili branş konsültasyonu

Yatış/ sevk

Psikiatri konsültasyonu; (Tüm istemli alımlar için).