



Ağız içini kontrol et, temizle



UYGUN POZİYON VER

-Travma yoksa "Baş Geri-Çene Yukarı Manevrası"  
-Travma şüphesi varsa "Çene İtme Manevrası" Uygula



Havayolu açık ve hasta solumuyorsa  
Ağız içinde yabancı cisim kontrolü yap



Herbiri 1-1, 5 sn. sürecek 2 etkili ağızdan ağıza solunum ver.  
Soluk verirken hastanın göğsü yükseliyor mu kontrol et.8-10  
soluk/dk. ' da uygula



Solunum yetersiz olduğunda ek yardımcılar  
-Airway, ek O2, pozitif basınçlı havayolu basıncı  
-Müdahale ile hasta normale dönmezse endotrekal entübasyon uygula.



YABANCI CİSME BAĞLI HAVAYOLU TIKALI  
İSE

-Hava yolu kısmı tıkalı ise solunumu ve  
öksürmeyi destekle

TAM TIKANMA VARSA MÜDAHALE ET  
-Abdominal manevra (Heimlick manevrası)  
yap.

(Manevrada 5 kez içeri ve yukarı bastır)  
-Manevraya 5'erli seriler halinde yabancı  
cisim çıkana veya hastanın bilinci kapanana  
kadar devam et.

