1.) AMAÇ: Mikrobiyoloji laboratuarında çalışılan testleri standardize etmek

2.) REHBERİ KULLANAN BİRİMLER: Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3.) TEST GİRİŞLERİ: Test girişleri için hastane otomasyon sisteminde hasta sayfasında yer alan “tetkik” menüsü seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse istek yapılabilir. Test seçimi tamamlandıktan sonra onaylanır ve hastalar poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma birimine yönlendirilir. Acil biriminde ve servislerde tetkik girişleri için aynı işlemler yapılır ve hastalardan alınan test materyalleri laboratuvar kayıt bölümüne gönderilir. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler laboratuvar bilgisayar sistemi tarafından görülmeyecektir.

4.) REHBER DETAYI:

ELSA	TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	ÖRNEK Türü / ÖRNEK Tüpü	TEST ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMA YÖNTEMİ	ÖRNEK ALIM KURALLARI	ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ	ÖRNEK ALINMASI VE TRANSFER KRİTERİ	ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ	SONUÇ VERME SÜRELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI	AÇIKLAMA
1	**HBsAg**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümine gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED Edilir	Numuneyi alındıktan sonra oda ısıında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.00 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
2	**Anti-HBs**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümine gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısıında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.00 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	

3	**Anti-HBc Total**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümine gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
4	**Anti-HBc IgM**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümine gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
5	**Anti HAV IgG**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümi gerekli ne değil sans	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	

6	**Anti HAV IgM**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümi gerekli ne değil sans	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
7	**Anti-HCV**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümi gerekli ne değil sans	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune,serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
8	**Anti-HIV**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümi gerekli ne değil sans	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiznumune, isimsizbarkodsuz numune,serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	

9	**Anti Toxoplas ma IgG**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmı zı kapaklı tüp	Kemilün gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı vtüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiznumune, isimsizbarkodsuz numune,serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısıında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
10	**Anti Toxoplasma IgM**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmı zı kapaklı tüp	Kemilümin gerekli e sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısıında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
11	**Anti Rubella IgG**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmı zı kapaklı tüp	Kemilümin gerekli e sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısıında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	

12	**Anti Rubella IgM**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümin gerekli e sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
13	**Anti Cmv IgG**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/ Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümines gerekli sans d eğil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
14	**Anti Cmv IgM**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/ Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümines gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	

15	**HBe -Ag**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümines gerekli sans değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
16	**Anti-HBe**	Hafta içi hergün	SERUM / Jelli Sarı/Kırmızı kapaklı tüp	Kemilümines sans gerekli değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	hemoliz, lipemi, ikter, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, serumu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	ELİSA Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	hergün saat 12.00'ye kadar laboratuara kabul edilen numunelerin sonuçları aynı gün 14.30 da; daha sonraki sonuçlar ertesi gün verilir.	
HEMATOLOJİ	**TEST ADI**	**Çalışma Zamanı**	**ÖRNEK Türü / ÖRNEK Tüpü**	**TEST ÇALIŞM ÖN A HAZIRLIK YÖNTEM İ**	**ÖRNEK ALIM KURALLARI**	**ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ**	**ÖRNEK ALINMASI VE TRANSFER KRİTERİ**	**ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ**	**SONUÇ VERME SÜRELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI**	**AÇIKLAMA**

1	**HEMOGRAM**	hergün	PLAZMA / EDTA' lı Mor kapaklı hemogram tüpü	Empedans gerekli değil flowsitometri	tüpün içinde EDTA olup olmadığı kontrol edilmeli tüpün işaretli çizgisine kadar kan alınmalı, alındıktan sonra tüp alt üst edip karıştırmalı,	pıhtılı, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Hemogram Grubu Barkodu yapışacak. Barkod tüpe te miz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: aynı gün saat 14.00'de ACİL: Örneğin laboratuara kabulünden en geç 30 dk. sonra	
2	**SEDİMENTASYON**	hergün	PLAZMA /Sitratlı Siyah kapaklı sedim tüpü	Westergren gerekli değil	mavi kapaklı tüpün içinde sitrat olup olmadığı kontrol edilmeli tüpün işaretli çizgisine kadar kan alınmalı, alındıktan sonra tüp alt üst edip karıştırmalı, hemen santrifüj edilmeli	pıhtılı, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Sedimentasyon Barkodu yapışacak. Barkod tüpe te miz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: aynı gün saat 14.00'de ACİL: Örneğin laboratuara kabulünden en geç 30 dk. Sonra	
3	**ABO/Rh kan grupl ama**	hergün	PLAZMA / EDTA'lı Mor kapaklı hemogram tüpü	Manuel Antijen- değil antikor aglütinasyon	gerekli	tüpün içinde EDTA olup olmadığı kontrol edilmeli tüpün işaretli çizgisine kadar kan alınmalı, alındıktan sonra tüp alt üst edip karıştırmalı,	pıhtılı, yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Kan Gru bu Barkodu yapışacak. Barkod tüpe te miz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: aynı gün saat 14.00'de ACİL: Örneğin laboratuara kabulünden en geç 30 dk. sonra	

SEROLOJİ	TEST ADI	Çalışma Zamanı	ÖRNEK Türü / ÖRNEK Tüpü	TEST ÇALIŞMA ÖNCESİ HAZIRLIK YÖNTEMİ	ÖRNEK ALIM KURALLARI	ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ	ÖRNEK ALINMASI VE TRANSFER KRİTERİ	ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ	SONUÇ VERME SÜRELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI	AÇIKLAMA
1	**BRUCELLA LAM AGLUTİNASYON (Rose Bengal)**	hergün	SERUM / jelli biyokimya tüpü	Manuel Özel bir antijen hazırlık antikor gerekli değil aglütinasyon	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, seru mu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Seroloji Brucella Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: aynı gün saat 14.00'de	
2	**BRUCELLA TÜP AGLUTİNASYON (WRIGHT)**	hergün	SERUM / jelli biyokimya tüpü	Manuel Özel bir hazırlık antijen gerekli değil antikor aglütinasyon	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	yanlış numune tüpü, yetersiz numune, isimsiz-barkodsuz numune, seru mu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Seroloji Brucella Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: Ertesi gün saat 11.00'de	

3	**VDRL**	hergün	SERUM / jelli biyokimya tüpü	İmmuno Özel bir hazırlık kromotografik gerekli değil	Mayi gönderilen koldan kan alma,vakutainer iğne ve vakumlu tüp kullan, kanı tüpe püskürterek boşaltma	yanlış numune tüpü, yetersiz num une, isimsiz-barkodsuz numune, seru mu ayrılmadan uzun süre beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Seroloji VDR L Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	RUTİN: aynı gün saat 14.00'de	

TEST ADI GAİTA	**Çalışma Zamanı**	**ÖRNEK Türü / ÖRNEK Tüpü**	**TEST ÖN ÇALIŞMA HAZIRLI YÖNTEMİK**	**ÖRNEK ALIM KURALLARI**	**ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ**	**ÖRNEK ALINMASI VE TRANSFER KRİTERİ**	**ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ**	**SONUÇ VERME SÜRELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI**	**AÇIKLAMA**
1 **Gaita mikroskopisi**	hergün	Gaita / Gaita kabı	Manuel gerekli mikroskopi değil	yeterli miktarda	Plastik Bardakda, yanlış numune tüpünde, yetersiz numune, beklemiş numune REDDEDİLİR.	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	GAİTA MİKROSKOBİSİ Barkodu yapışacak. Barkod temiz, hasarsız vaziyette yapışacak	Rutin: hergün 14.00 Acil: numunenin laboratuar tarafından materyal kabulünden en geç 30 dk sonra	
2 **Rota-Adero virus**	hergün	Gaita / Gaita kabı	Manuel gerekli mikroskopi değil	yeterli miktarda	Plastik Bardakda, yanlış numune tüpünde, yetersiz numune, beklemiş numune REDDEDİLİR.	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	GAİTA MİKROSKOBİSİ Barkodu yapışacak. Barkod temiz, hasarsız vaziyette yapışacak	Rutin: hergün 14.00 Acil: numunenin laboratuar tarafından materyal kabulünden en geç 30 dk sonra	

KÜLTÜR	**TEST ADI**	**Çalışma Zamanı**	**ÖRNEK Türü / ÖRNEK kabı**	**TEST ÇALIŞMA YÖNTEMİ**	**ÖN HAZIRLIK ÖRNEK ALIM KURALLARI**	**ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ**	**ÖRNEK ALINMASI VE TRANSFER KRİTERİ**	**ÖRNEK KAPLARININ ETİKETLENMESİ**	**SONUÇ VERME SÜRELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI**	**AÇIKLAMA**

1	**BOĞAZ KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	Boğaz sürüntüsü / transport besiyeri	hasta son 3 gün içinde antibiyotik almamalı, numune vermeden Manuel ö Besiyerind nce gargara e üretme yapmamalıdır	ağız içine ve dile değdirilmeden boğazdan alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kab ı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune,RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Boğaz Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
2	**İDRAR KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	idrar / Steril idrar kabı	hasta son 3 gün Manuel içinde antibiyotik Besiyerind almamalı, e üretme numune vermeden önce çok su içmemeli ve	steril kaba orta idrar verilmeli	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kab ı, yetersiz numune,	Numuneyi alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde kapaklı kapta laboratuara	İdrar Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
				temizlenmelidir.		isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	gönderilmelidir.			
3	**BURUN KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	burun sürüntüsü / transport besiyeri	Manuel hasta son 3 Besiyerinde gün içinde üretme antibiyotik almamalı, burun antiseptiği kullanmamalı dır	burundan alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Burun Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
4	**GAİTA KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	gaita/ gaita kabı	Manuel hasta son 3 Besiyerinde gün içinde üretme antibiyotik almamalıdır	yeterli miktarda olmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Gaita Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	

5	**BOS KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	BOS / Steril Enjektör	Manuel gerekli değil Besiyerinde üretme	kan ve diğer sıvılar bulaşmamalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra hemen kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	BOS Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.		
6	**KONJUNKTİVA KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	göz sürüntüsü / transport besiyeri	Manuel Besiyerinde üretme	hasta son 3 gün içinde antibiyotik almamalıdır	gözden alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune,RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Konjunktiva Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
7	**KULAK KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	kulak sürüntüsü / transport besiyeri	Manuel Besiyerinde üretme	hasta son 3 gün içinde antibiyotik almamalı, antiseptik damla damlatılmamalıdır.	kulaktan alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Kulak Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
8	**MANTAR KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	doku kazıntısı / steril tüp veya transport besiyeri	Manuel Besiyerinde üretme	hasta son 3 gün içinde antifungal almamalıdır	uygun şekilde alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune,RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Mantar Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
9	**VAGİNAL AKINTI KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	vaginal akıntı / transport besiyeri	Manuel Besiyerinde üretme	hasta son 3 gün içinde antibiyotik almamalıdır	vajinadan alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Vagina Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	

10	**YARA KÜLTÜRÜ**	hafta içi hergün	pü / transport besiyeri veya steril enjektör	Manuel Besiyerinde üretme	hasta son 3 gün içinde antibiyotik almamalı, numune vermeden önce pansuman yapmamalıdır	yaradan alınmalı	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Yara Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 2 gün sonra verilir.	
11	**KAN KÜLTÜRÜ**	Hergün	Kan kültür şişesi	Manuel Besiyerinde üretme	Cilt alkol ve batikon ile temizlenir	24 saat içinde ateşli dönem içinde en az 3 örnek alınmalıdır.	ağzı kapanmamış kap,yanlış numune kabı, yetersiz numune, isimsiz- barkodsuz numune, beklemiş numune, RED EDİLİR	Numuneyi alındıktan sonra oda ısısında, 1 saat içinde toplu olarak kapaklı kapta laboratuara gönderilmelidir.	Kan Kültürü Barkodu yapışacak. Barkod tüpe temiz, hasarsız,dik vaziyette yapışacak	numunelerin materyal kabulunden 7 gün sonra verilir.	
12	**SPERMİYO GRAM**	Salı, perşembe	Sperm/steril idrar kabı	Manuel mikroskobi	3-5 günlük cinsel perhiz	Hastaya numune kabı içerisine su, tükürük vb. kaçırmaması söylenir.	Yanlış numune tüpünde beklemiş numune	Numune alındıktan sonra oda ısısında en fazla 15 dakika içerisinde laboratuara ulaştırılmalıdır.	Spermiyogram barkodu numune kabına yapıştırılır. Barkod tüpe temiz hasarsız ve dik vaziyette yapıştırılır.	Numune alındığı gün saat 14.00 de sonuç verilir.	

**** Laboratuvar 24 saat çalıştığı için numunelerde bekleme olmamaktadır