Kloralhidrat, (CCI3-CH(OH)2) uyku getiren bir ilaçtır. Tedavi dozlarında alındığında 30-40 dk sonra başlayan 8

saat kadar süren tabii bir uyku sağlar. Öncesinde çocuğunuzu uykusuz bırakmanız (normal uykusunun ikinci yarısını almaması, örneğin 24 ten sonra saat 8'e kadar uyuyan çocuğunuzun saat 4'ten sonra uyutulmaması) ilacın etkilemesini kolaylaştıracaktır. Yan etkiler kısmında önerildiği şekilde çocuğunuzun beslenmesini düzenleyiniz. Çocuğunuzun alerjisi, herhangi bir hastalığı veya ilaç kullanımı varsa doktorunuza bilgi veriniz.

Niçin Kullanılır?

Çocuğun hareket etmemesi gereken ağrısız işlemlerde kullanılır.

Örneğin 1-Görüntüleme işlemleri (Tomografi (BT), Manyetik Rezanans (MR))

2-Çocuğun hareketlerinin engel olabileceği muayene veya laboratuar işlemlerinde

3-EEG Çekimi

Nasıl Kullanılır?

Toz halinde satılan ilaç sulandırılarak kullanılmaktadır. İlaç eczanelerde toz halinde bulunmakta ve doktorunuzun

yazdığı gramajda eczacınız tarafından tartılarak verilmektedir. İlacın yüksek dozda alınması, yüksek risk oluşturabileceğinden mutlaka bir sağlık kuruluşunda ve bir sağlık personelinin tarifi ile kullanılmalıdır. İlaç kilogram (kg) başına 50 miligram(mg) uygulanır. Örneğin çocuğunuz 10 kg ise 500 mg ilaç verilir. Bu doz gerektiğinde doktor tarafından arttırılabilir. Tek kullanımda maksimum 1000 mg , toplamda ise maksimum 2000mg (2 gr) uygulanır. İlaç tadının acılığı nedeni ile ya meyve suyuna karıştırılıp içirilerek veya rektal (makat) yolla uygulanabilir.

Uygulama yolunu çocuğunuzun durumuna göre sağlık personeli belirlemelidir.

Yan Etkiler Nedir?

150 yıldır kullanılmakta olan kloralhidratın aynı amaçla kullanılan diğer ilaçlar gibi yan etkileri mevcuttur.Uyku

hali yapan ilaçlar aynı zamanda koruyucu refleksleride baskılar. Kusma ve mide içeriğinin akciğere kaçma riski artar. Bu yüzden ilaç uygulanmasından 4 saat önce katı gıdaların 2 saat önce sıvı gıdaların kesilmesi gerekmektedir. İlaç uygulanma sonrasında da doktorunuz size söyleyene kadar sıvı veya katı gıda verilmemelidir.

Yüksek dozlarda ve çok nadiren normal dozlarda solunumu durdurma riski vardır. Bu durum acil müdahale gerektirdiğinden ilaç alımından itibaren eve gönderilme kararı verilene kadar sağlık kuruluşunda sağlık personelinin gözetimi altında kalmalısınız.

Uzun süreli kullanımı bağımlılık yapabilir.Olası kanserojen riskleri nedeni ile tekrar dozlardan kaçınılmalıdır. Bu tür sorunların yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmakla birlikte problem olmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez.

Ne zaman Eve Gidebilirsini?

Uygulanan ilacın uyku etkisi tamamen ortadan kalkınca eve gidebilirsiniz. Bunun için ilaç uygulamasını yapan sağlık personeli sizi tekrar değerlendirecektir.

Evde Ne Yapılması Gerekir?

Genellikle ilaç uygulamasından sonra ortalama 4-5 saat sonra eve gidebilirsiniz. Sonrasında olumsuz beklenilmemekle birlikle uyandırmakta güçlük çekerseniz, kusma eşlik ederse veya sizi rahatsız eden herhangi bir semptom varlığında tekrar bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Çocuğunuzun hafif uyku hali 8-10 saate kadar uzayabilir.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım

Yukarıdaki yazı bana ..... okundu bende dinledim ve anladım. Yasal velisi yada vasisi olduğum çocuğum,.....'ya uyku halinin sağlanması amacı ile kloralhidrat verilmesini, yukarıda yazılan tüm risklerle birlikte kendi rızamla kabul ediyorum.

Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, İmza Şahid Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi,İmza

..../...../20.. Saat

***(Formu imzalayan kişi kendi el yazısı ile ''formu okudum anladım ''şeklinde yazdıktan sonra imzasını atacak.)