İLACIN JENERİK ADI	GEBELİKTE KULLANIM KATEGORİSİ
AMPİSİLİN VE AMPİSİLİN SULBAKTAM	**B**
AMOKSİLİN VE AMOKSİLİN KLAVUNAT	**B**
PENİSİLİN G ve V	**B**
SEFOTAKSİM	**B**
PARASETOMOL	**B**
NAPROKSEN	**C**
LOPERAMİD	**B**
DİKLOFENAK	**C**
FLURBİPROFEN 3. TRİMESTERDE **D**	**C**
METRANİDAZOL VE ORNİDAZOL	**B**
PAROKSETİN	**C**
FENİTOİN	**D**
RİFAMPİSİN	**C**
FLUKANOZOL	**D**
ASPİRİN	**C**
FLUOROKİNOLONLAR	**C**
TEOFİLİN	**C**
MİKANAZOL	**C**
DOKSİSİKLİN	**D**
SİTALOPRAM	**C**
SERTALİN	**C**
FOLİK ASİT, PRİDOKSİN, TİAMİN	**A**
LEVOTİROKSİN	**A**
VENLAFAKSİN	**C**
BETAMETAZON, DEXAMETHAZON	**C**
KARBAMAZEPİN	**D**
VARFARİN	**X**
VALPROİK ASİT	**D**
KLORFENİRAMİN	**B**
HİDROKSİZİN(ATARAKS)	**C**
ERGOTAMİN	**X**

İlaçlar gebeliğin bütün dönemlerinde fetüs üzerinde zararlı etki gösterebilir.Gebelikte ilaç kullanımının en tehlikeli dönemi **3-11** haftalar arasındadır.

FDA GEBELİKTE İLAÇ KATEGORİLERİ

Kategori **A**	Kategori **B**	Kategori **C**	Kategori **D**	Kategori **X**
İnsan ve hayvanda güvenli; Magnezyum sülfat, Levotiroksin, Folik Asit	Hayvanda teratojen değil, insanda yeterli, kontrollü çalışma yok/ güvenli Zofran, Amoksisilin	İnsan ve hayvanlarda kontrollü çalışma yok.Risk? Kar/Zarar oranı göz önünde bulundurularak kullanılır.Prozac, Tamiflu	İnsan ve hayvanlarda teratojen.Ancak hastaya yararı göz önünde bulundurularak kullanılabilir.Tetrasiklinler	Gebelikte kesinlkle yasak ancak anne yaşamı söz konusu ise.Antihiperlipidemikler

Antibakterial İlaçların Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B:
Penisilinler, Sefalosporinler, (seftriakson, sefiksim, sefotaksim), Amoksilin, /klavulonat, Makrolider (Eritromisin), Azitromisin, Meropenem, Ertapenem, Aztreonam, Metronidazol, Klindamisin, Fosfomisin, Ni trofurantoin:Gebeliğin sonunda kullanılırsa yenidoğanda hemolize neden olabilir.

KATEGORİ C: İpipenem/Silastatin. Klaritromisin, Telitromisin, Vankomisin: Kloramfenikoil, Rifampisin: Yenidoğanda kanama riskini arttırabilir.Kinolanlar:Ofloksasin iskelet sistemi deformitesi yapar.Siprofloksasin, Levofloksasin, Moksifloksasin, Kotirimoksazol, Linezolid.

KATEGORİ D: Aminoglikozitler:İşitme siniri yada vestibüler sinir hasarı yapar.En riskli ilaç Streptomisindir.Gentamisin ve topramisinle çok az risk olabilirsede zorunlu değilse kullanılmamalıdır. Tetrasiklinlerin kemik ve kıkırdak doku üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Antifungal İlaçların Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Amfoterisin

KATEGORİ C: Caspofungin, Flukonazol, İtrakonazol, (bir sonraki menstürasyona dek etkili) Ketakonazol, Posakonazol

KATEGORİ D: Valikonazol

Antiparaziter İlaçların Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: prazikuantel

KATEGORİ C: Albendezol, Mebandezol, Klorikin, Meflokin, Pentamidin, Primetamin

KATEGORİ D:

KATEGORİ X: Kinin

Antiviral İlaçların Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Asiklovir, Famsiklovir, tonofovir, valasiklovir

KATEGORİ C: Adefovir, Amantadin, Entokavir, Gansiklovir, İndainavir, interferonlar, lamivudin, oseltavimir, Rimantadin, Valgansiklovir, Zanamivir

KATEGORİ D:

KATEGORİ X: Ribavirin

Epilepsi İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ C: Lamotrigine, Oxycarbazepine, Gabapentin, Topiramat, Etosuksimid

KATEGORİ D: Fenitoin, Valproik asit, Karbamazepin, Trimetadion, Fenobarbital

KATEGORİ C: Daha güvenli özellikle Lamotrigine anomali riski %1.8-3

KATEGORİ D: Düşük IQ gelişme geriliği kalp ve idrar yolları anomalileri, yarık damak dudak, nöral tüp defekti

Psikiyatrik İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Maprotilin, bupropion, Buspiron(Klozapin)

KATEGORİ C: SSRİ; Essitalopram, fluoksetin, sertalin, sitolopram, TCA; Klomipramin, imipramin, doksepin, bupropion, mirtazetin, venlafaksin

KATEGORİ D: SSRİ; Paroksetin, lityum TCA; Amitriptilin, Nortriptilin

Ülser İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Antiasitler, magnezyum.aliminyum, kalsiyum, karbonat gibi metal tuzları H2 blokerler, famotidin, simetidin, ranitidin

KATEGORİ C: PPİ; Omeprazol

KATEGORİ D:

Allerji İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Klorfeniramin, deksklorfeniramin, setirizin, loratidin, levosetirizin

KATEGORİ C: Prometazin, hidroksizin, desloratidin

KATEGORİ D:

Hiperemezis Gravidarum ve Aşırı Kusmada Verilen İlaçlar

KATEGORİ B: satalol, asebutalol

KATEGORİ C: Adenozin, digoksin

KATEGORİ D: Amiodaron

Antihipertansif İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Metildopa

KATEGORİ C: nitratlar, Ca kanal blokerleri, ACEİ(enapril, captoril, lisinopril) be ARB (lepatalol, hidroklortiazid)

Genel Lokal Anestezi Sedasyon İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

KATEGORİ B: Lidokain, ropivakain, morfin (1.trimestir), propofol, meferidin, rocuronyum, cisatracurium

KATEGORİ C: bupivakain, atracurium, süksinikolin, fentanly, alfentanly, sulfentanly, etomidat

KATEGORİ D: midazolam diazem, morfin