1. 0ksijen Tedavisi; 6-7lt/Dk

2. Antikoagülan tedavi;

a) Fraksiyone olmayan heparin (VFH); 80Ü/kg iv bolus, 18 Ü/kg/h infüzyon (tPA verirken stopla, aPTT normalin 2 katına düşmedikçe başlama).
b) Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH); 1 mg/kg sc, günde 2 kez (clexane)
c) Varfarin (Coumadin); VFH, LMVH veya Fndaparinux ile aynı zamanda başlanır ve en az 5 gün beraber kullanılır).
d) Fondaparinux; Günde 1 kez sabit dozda sc.
** <50 kg için 5 mg*
** 50-100 kg için 7.5 mg*
** >100 kg için 10 mg*

Fibrinolitik tedavi endikasyonları:

1- Doğrulanmış PE tanısı(+) ve Hemodinamik anstabil hasta olacak
Ya da
2- Doğrulanmış PE tanısı(+) ve Hemodinamik stabil olan ve EKO da sağ ventrikül disfonksiyonu olan hastalar

3. Fibrinolitik tedavi;

a) Alteptaz (tPA)(Actilyse); 15 mg iv bolus, 85 mg 2 saatte infüzyon)
b) Streptokinaz (streptase); 250.000 Ü iv bolus 30 dk da. Takibinde 1000.000 Ü/24 saat infüzyon.
c) Ürokinaz; 4400 Ü/kg iv bolus 10 dk. takiben 4000 Ü/kg/saat (12 saat boyunca).