(KAYNAK) HASTA	ÇALIŞAN TESTLERİ	ÇALIŞANIN LABORATUVAR SONUCU	KORUNMA	TAKİP
HBsAg (+)	HBsAg Anti HBs	HBsAg (+) Anti HBs (-) ise	HBsAg (+) Açısından ileri tetkik önerilir.	HBsAg (+) Enfeksiyon Hastalıkları plk. tarafından izlenir.
		Anti HBs (+) HBsAg (-)	Anti HBs ≥ 10 iu Bir şey yapmaya gerek yoktur.	
		HBsAg (-) Anti HBs (-) ise	Hepatit B aşısı (0.1.2.12. aylarda) Deltoid Kastan İM Hepatit B immunglobulin 0,06 mL / kg İM	3 doz aşılama sonrası Anti HBs bakılır.
HBsAg (-)	HBsAg Anti HBs	Anti HBs (+) Anti HBs (-)	Anti HBs ≥ 10iu Bir şey yapmaya gerek yok.	3 doz aşılama sonrası Anti HBs Bakılır.
		Anti HBs (-) Anti HBs (-)	Hepatit B aşısı (0.1.6. aylarda)Deltoid Kastan İM	3 doz aşılama sonrası Anti HBs Bakılır.
Bilinmiyor	HBsAg Anti HBs	Anti HBs (-) Anti HBs (-)	Hepatit B aşısı (0.1.2.12.aylarda)Deltoid Kastan İM Hepatit B İmmunglobulin 0,06 mL/ kg İM	-3. ve 6. ayda HBsAg Anti HBs

SAĞLIK ÇALIŞANI TAKİP PROGRAMI

(KAYNAK) HASTA	ÇALIŞAN TESTLERİ	ÇALIŞANIN LABORATUVAR SONUCU	TAKİP
Anti HCV (+) HCV RNA (+)	Anti HCV,ALT	Anti HCV (+)	Anti HCV Açısından ileri tetkik önerilir.
		Anti HCV(-)	İlk başvuruda Anti HCV(-) olan hasta 1. Ayda Anti HCV ve ALT iste, HCV RNA için kan saklanır.2 ve 3. Aylarda Anti HCV bakılır. HCV RNA için kan saklanır.6. ayda Anti HCV bakılır.
Anti HCV(+) HCV RNA(-)	Anti HCV,ALT	Anti HCV(-)	İlk başvuruda Anti HCV(-) olan hasta 1. Ayda Anti HCV ve ALT iste , 3.ve 6.aylarda Anti HCV bakılır.

Not:Semptomatik olguda infeksiyonun kendiliğinden sonlanabileceği için 8- 16 hafta beklenir.Bu süre sonunda HCV RNA(-) olmayan olgular interferon ile tedavi başlanır.Tedavi 24 hafta devam edilir.