Hastaya Pozisyon Ver (Hasta sedyeye oturtulur)

Oksijen (6-8 lt/dk)
Monitörizasyon
Morfin (2-3 mg iv)(KOAH, Astım, Kor pulmonale de Sol.Depresyonu Yapabilir)
Diüretik (furosemid) 40-80 mg iv, idamesi infüzyon
Aminofilin – *bronkodilatatör, renal kan akım artırıcı, diüretik etkisi, (+) inotrop etkisi, venodilatatör olarak* (6 mg/kg yükleme(20 dk), devamında 0.6 mg/kg/saat infüzyon)

Hasta Hipertansif ise;

Nitrogliserin –*koroner vazodilatatör olarak* (10 mikrogram/kg/dk)
Nitroprussid- *arteryal-venöz dilatatörolarak* (0.5-1 mikrogram/kg/dk

Hasta Hipotansif ise;

Dopamin (2-20 mikrogram/kg/dk)
Dobutamin (2-20 mikrogram/kg/dk)

Kardiyoloji ve/veya Anestezi konsültasyonu

Solunum sıkıntısı düzelmediyse;

Gerekiyorsa **CVAP**
Gerekiyorsa **Entübasyon** ve **Mekanik ventilasyon**
(PCO2>60, PO2<60 PH<7.2, Bilinç bozukluğu varsa)

Servise/yoğun bakıma yatış.
Ya da sevk işlemi.