# DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ (HENDRİCH II)

| | |
|---|---|
| **Konfüzyon/ Dezoryantasyon** | **4 Puan** |
| **Semptomatik Depresyon** | **2 Puan** |
| **Boşaltım İhtiyacında Sorun** | **1 Puan** |
| **Baş Dönmesi** | **1 Puan** |
| **Cinsiyet Erkek** | **1 Puan** |
| **Antiepileptik Grubu ilaç kullanımı** (Karbamezepin, Tegretol, Phenytoin, Eptantoin, Valporik Asit, Depakin, Pimidon, Mysoline, Lamotrigin, Lamictral, Phenobarbital, Luminal, Exhosuximid, Petimid) | **2 Puan** |
| **Benzodiazepin Grubu İlaç Kullanımı** (Alprazolam, Xanax, Buspiran, Buston, Chlordiazepoxid, Librium, Clonazepam, Rivotril, Clorazepatdipotasyum, Tranxilane, Diazepam, Diazem, Lorazepam, Rivotril, Midazolam, Dormicum, Oxazepam, Serapax) | **1 Puan** |
| **TOPLAM PUAN** | |

| **RİSK ÖLÇÜMÜ** | **PUANLAMA** | **YAPILMASI GEREKEN FAALİYET** |
|---|---|---|
| Risk Yok | 0-4 | Haftada bir düşme riskini yeniden değerlendir. |
| Yüksek Riskli | 5 ve | Her gün düşme riskini yeniden değerlendir + Düşme Riski Değerlendirme ve Bakım Prosedürü Uygula |

## HENDRİCH II SKALASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HASTA GRUPLARI

| | | |
|---|---|---|
| *65 yaş üstü hastalar, | *Duruş denge bozukluğu olan hastalar, | *Dışkı ve idrar tutmada güçlük çekenler, |
| *Bedensel engelliler, | *Post-op döneminde mobilize edilen hastalar, | *Fazla sayıda ilaç kullanan hastalar, |
| *Şuuru kapalı hastalar, | *Karar verme yeteneği azalmış hastalar, | *Güçsüzlük, |
| *Baş dönmesi ve vertigosu olanlar | **HENDRİCH II SKALASI** uygulanarak değerlendirilmelidir. | |

## HENDRİCH II SKALASI İŞLEM BASAMAKLARI

*Skala değerlendirmenizi yaparak sonucu değerlendirme formuna not alınız.
*Bakım planını oluştururken NANDA tanınızı belirleyiniz.
*Hastanıza uygun düşme riski değerlendirme ve bakım prosedürlerinizi uygulayınız.