KLİNİK DURUMU	**Normal**	**Bilinç Açık**	**Huzursuz**
	ANT Normal	**Bilinç Kapalı**	

UYMASI GEREKEN KURALLAR	**Her gün;aynı tartı aleti ve aynı giysi ile aynı saatte tartılınız.**
	Alacağınız günlük sıvı miktarı 2 litreyi geçmemelidir.
	Katater bakımınıza dikkat ediniz.
	Kan basıncınızı sık sık kontrol ettiriniz.
	Diyet programınıza kesinlikle uyunuz.
	İlaçlarınızı önerilen miktarlarda ve zamanında alınız.
	Mümkün olan sıklıkta (her gün yada gün aşırı) banyo yapınız.Bilhassa fistül kolu İyice temizleyiniz.
	Düşme ve çarpmalarda kendinizi koruyunuz.
	Fistül bakımınıza itina gösteriniz.
	Size verilen hemodiyaliz programına ve saatlerine mutlaka uyunuz.

KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLAR		

BESLENMEDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR	**Tuzdan kısıtlı diyet uygulayınız.**
	Fosfordan kısıtlı diyet uygulayınız.
	Potasyumdan kısıtlı diyet uygulayınız.
	İki diyaliz arası 2 litreden fazla sıvı tüketilmemelisiniz.
	Tütün ve alkol kullanmayınız.

	Enfeksiyon	**Göğüs ağrısı**

KURALLARA UYMAMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK RİSKLER	**Yaralanma**	**Kramp**
	Kanama	**Tansiyon Yüksekliği**
	Düşme	**Tansiyon Düşüklüğü**
	Diyaliz Yetersizliği	**Kaşıntı**
	Kemiklerde bozukluk	**Ağrı**
	Ödem	**Bulantı**
	Kusma	**Solunum sıkıntısı**
	Öksürük	

Eğitimi veren Adı-Soyadı-İmza **Hasta Adı- Soyadı-İmza**