**AMAÇ:** HASTA ve DONÖR' de ZAYIF D çalışılması

**KAPSAM:** TM Sorumlu Hekim ve TM çalışanları

**SORUMLULAR:** TM Sorumlu Hekim ve TM çalışanları

**UYGULAMA:**

**1.HASTA** %2-5'lik eritrosit süspansiyonu hazırlanır.2 tüp hazırlanır. Tüplerin birine ANTİ-D işaretlenir ve damlatılır. İkincisine ZAYIF D işaretlenir ve damlatılır. Üzerlerine %2-5'lik HASTA Eritrosit süspansiyonundan 1er damla damlatılır. Santrifüj edilir. Aglütinasyon yönünden değerlendirilir.

**AGLÜTİNASYON YOKSA: HASTA ANTİ-D VE/VEYA ZAYIF D NEGATİF**

**AGLÜTİNASYON VARSA: HASTA ANTİ0D VE/VEYA ZAYIF D POZİTİF TİR.**

2.DONÖR %2-5'lik eritrosit süspansiyonu hazırlanır.2 tüp hazırlanır. Tüplerin birine ANTİ-D işaretlenir ve damlatılır. İkincisine ZAYIF D işaretlenir ve damlatılır. Üzerlerine %2-5'lik DONÖR eritrosit süspansiyonundan 1er damla damlatılır. Santrifüj edilir. Aglütinasyon yönünden değerlendirilir

**AGLÜTİNASYON YOKSA: HASTA ANTİ-D VE/VEYA ZAYIF D NEGATİF**

**AGLÜTİNASYON VARSA: HASTA ANTİ0D VE/VEYA ZAYIF D POZİTİF TİR.**

**3 .** Lüzum görüldüğü durumlarda ..... Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi' ne zayıf D için numuneleri (hasta ve donör) gönderilmektedir.