Tarih:							**Yaşı:**						
Hastanın Adı Soyadı/Cinsiyeti:							**Yattığı Bölüm:**						
Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası	**1**	**İlk Değerlendirme**	**2**	**Post-op Dönem**	**3**	**Hasta Düşmesi**	**4**	**Bölüm Değişikliği**	**5**			**Durum Değişikliği**	
Parametreler	**Risk Faktörleri**							**Puan**	**İlk Değ.**	**Yeniden Değ.**			
									.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...
YAŞ	60-69							1	1	1	1	1	1	1
	70-79							2	2	2	2	2	2	2
	80 ve üstü							3	3	3	3	3	3	3
BİLİNÇ DURUMU	Bilinci kapalı.							1	1	1	1	1	1	1
	Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)							2	2	2	2	2	2	2
DÜŞME HİKAYESİ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.							3	3	3	3	3	3	3
HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet,artrit, osteoporoz, kırıklar)	Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır.							1	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.							2	2	2	2	2	2	2
HAREKET KABİLİYETİ	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.							5	5	5	5	5	5	5
	Ayakta/yürürken denge bozukluğu var.							10	10	10	10	10	10	10
	Baş dönmesi var.							2	2	2	2	2	2	2
BOŞALTIM İHTİYACI	Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.							1	1	1	1	1	1	1
GÖRME DURUMU	Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)							2	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.							10	10	10	10	10	10	10
İLAÇ KULLANIMI	4'den fazla ilaç kullanımı var.							2	2	2	2	2	2	2
	Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.							2	2	2	2	2	2	2
	Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.							3	3	3	3	3	3	3
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.)	Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.							1	1	1	1	1	1	1
	Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.							2	2	2	2	2	2	2
TOPLAM														

RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU: Düşük Risk 0-9 Puan Arasında **Yüksek Risk** 10 Puan Üzerinde

Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:.....İmza:
NOT:* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir. * İtakî Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır. * Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.