İLACIN ADI	KULLANIM SÜRELERİ	KULLANIM YÖNTEMİ	SAKLAMA KOŞULLARI
ACTRAPİD FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 6 hafta	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
HUMULİN R FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 4 hafta	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
INSULATARD HM FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 6 hafta	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
LANTUS SOLOSTAR KALEM	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 4 hafta	Her enjeksiyonda yeni bir iğne kullanılmalıdır	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
LEVEMİR FLEXPEN KALEM	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 6 hafta	Her enjeksiyonda yeni bir iğne kullanılmalıdır	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
MİXTARD FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 6 hafta	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
AMPİSİD FLAKON	Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 8 saat , buzdolabında 48 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
BETAKSİM FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat ,buzdolabında 5 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
CEFAKS FLAKON	Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 saat ,buzdolabında 48 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
CEFOBİD FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 5 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
CITANEST FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
CİPRO FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabı veya oda sıcaklığında 14 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
COLİMYCİN FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 7 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
DEPAKİN FLAKON	Sulandırıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
ESMERON FLK	Açıldıktan sonra buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
HEPARİN/ KOPARİN FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 28 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
INVANZ FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 6 saat,buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
MARCAİNE FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır

İLACIN ADI	KULLANIM SÜRELERİ	KULLANIM YÖNTEMİ	SAKLAMA KOŞULLARI
MEROSİD FLAKON	İzotonik içerisinde sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
SEFAZOL FLAKON	Sulandırıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
SEFBAKTAM FLAKON	Sulandırıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
PANTONİX FLK	Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 12 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
PRİLOC FLK	Açıldıktan sonra 3 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TALİNAT AMP.	Seyreltildikten sonra buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TAZOCİN FLAKON/ TAZOPER FLK.	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 48 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TEKOSİT FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TİENAM FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TYGACİL FLAKON/ MRSACİN FLK	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
UNİSEF FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
ULTİVA FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
VANCOMYCİN FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 4 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
VOLEFLOK FLAKON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 3 gün	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
ZIDIM FLAKON	Açıldıktan sonra buzdolabında 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
FUNGOSTATİN SÜSPANSİYON	Açıldıktan sonra buzdolabında 10 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
KLAMER ORAL SÜSPANSİYON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 14 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
MUCOLATOR ŞURUP	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 12 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır

İLACIN ADI	KULLANIM SÜRELERİ	KULLANIM YÖNTEMİ	SAKLAMA KOŞULLARI
SULCİD ORAL SÜSPANSİYON	Açıldıktan sonra buzdolabında 14 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
ALCAİNE GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra buzdolabında 1 ay	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
MYDFRİN GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 15 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TOBSİN GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 15 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
TROPAMİD GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 15 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır
VİGAMOX OFTALMİK SOLÜSYON	Açıldıktan sonra oda sıcaklığında 28 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır