Bu liste, ekstravazasyon riskine göre sık kullanılan kemoterapi ilaçlarının sınıflandırmasını gösterir. Bazı ilaçlar kaynaklara ve konsantrasyona göre farklı sınıflandırılabilir; liste, kurumda kullanılan ilaçlara ve ilaçların güncel prospektüslerine göre hastane eczanesi tarafından yılda en az bir kez gözden geçirilir.

VEZİKAN İLAÇLAR

İlaç	Grubu	Lokal uygulama	Açıklama
Doksorubisin	Antrasiklin	Soğuk	Antidot: deksrazoksan / DMSO
Epirubisin	Antrasiklin	Soğuk	Antidot: deksrazoksan / DMSO
Daunorubisin	Antrasiklin	Soğuk	Antidot: deksrazoksan / DMSO
İdarubisin	Antrasiklin	Soğuk	Antidot: deksrazoksan / DMSO
Mitomisin C	Antitümör antibiyotik	Soğuk	DMSO
Daktinomisin	Antitümör antibiyotik	Soğuk	
Vinkristin	Vinka alkaloidi	Sıcak	Antidot: hiyalüronidaz. Yalnızca intravenöz uygulanır.
Vinblastin	Vinka alkaloidi	Sıcak	Antidot: hiyalüronidaz
Vinorelbin	Vinka alkaloidi	Sıcak	Antidot: hiyalüronidaz
Mekloretamin	Alkilleyici	—	Antidot: sodyum tiyosülfat
Trabektedin	Alkilleyici	—	Santral venöz yol önerilir
Amsakrin	Topoizomeraz inhibitörü	—	

İRRİTAN İLAÇLAR (vezikan özellik gösterebilenler belirtilmiştir)

İlaç	Grubu	Lokal uygulama	Açıklama
Paklitaksel	Taksan	Soğuk	Vezikan özellik gösterebilir; hiyalüronidaz kurum protokolüne göre
Dosetaksel	Taksan	Soğuk	Vezikan özellik gösterebilir
Oksaliplatin	Platin bileşiği	Sıcak	Soğuk uygulanmaz. Yüksek konsantrasyonda vezikan özellik gösterebilir.
Sisplatin	Platin bileşiği	Soğuk	Yüksek konsantrasyonda vezikan özellik gösterebilir
Karboplatin	Platin bileşiği	Soğuk	
Mitoksantron	Antrasendion	Soğuk	Vezikan özellik gösterebilir
Bendamustin	Alkilleyici	Soğuk	Vezikan özellik gösterebilir
Dakarbazin	Alkilleyici	Soğuk	Işıktan korunur
Karmustin	Alkilleyici	Soğuk	
Etoposid	Topoizomeraz inhibitörü	Sıcak	
İfosfamid	Alkilleyici	Soğuk	
Fluorourasil	Antimetabolit	Soğuk	
Bortezomib	Proteozom inhibitörü	Soğuk	
Gemsitabin	Antimetabolit	Soğuk	Hafif irritan

VEZİKAN OLMAYAN İLAÇLARA ÖRNEKLER

Siklofosfamid, metotreksat, sitarabin, bleomisin, fludarabin, pemetreksed, monoklonal antikorlar (ör. rituksimab, trastuzumab, bevasizumab). Bu ilaçlarda ekstravazasyon olduğunda infüzyon durdurulur, ekstremite yukarıda tutulur ve semptomatik tedavi uygulanır.

KURUMDA KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR

İlaç	Sınıf (vezikan / irritan / vezikan olmayan)	Lokal uygulama	Açıklama

Hazırlayan (Hastane Eczacısı)	Kontrol Eden (Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hekimi)
Adı Soyadı:	Adı Soyadı:
Tarih / Saat:	Tarih / Saat:
İmza:	İmza:

Bu örnek doküman Prokalite tarafından hazırlanmıştır. Kurumunuzun yapısına, yürürlükteki mevzuata, Sağlık Bakanlığı rehberlerine ve güncel bilimsel kaynaklara göre uyarlanmalı; ilaç, doz ve süre bilgileri kurumun yetkili hekim ve eczacıları tarafından doğrulanmalıdır.