Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi

BARKOD

İŞLEM KİM TARAFINDAN YAPILACAK: İşleminiz Kadın Doğum uzmanı tarafından hastanemiz

ameliyathanesinde yapılacaktır.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR/MUHTEMEL SEBEPLERİ

V E NA S IL S E YR E D ECEĞİ: Rahimden myomalınma ameliyatı (myomektomi) myomun yerleşim yeri vebüyüklüğü göz ününe alınarak hazneden (vajinal) ya da karından kesi ile ya da karına açılan delikler veoptik cihaz kullanımı ile kapalı yöntemle (laparoskopik)yapılabilir.

Ameliyat sırasında rahim duvarından myom çıkartıldıktan sonra rahime dikiş atılarak iyileşmesi sağlanır.

Önerilen cerrahi girişim:

➢ Karından kesi ile (abdominal)

➢ Hazneden (vaginal)

➢ Kapalı yöntem (laparoskopik)

İŞLEMİN UYGULANMAMASI/REDDETME DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR:

Benim için uygun görülen cerrahi girişim yapılmazsa hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar bana anlatıldı: Eğer aşırı kanamalar nedeniyle ameliyat yapılacaksa bu kanamaların devamı nedeniyle kansızlık gelişebileceği ve kansızlığa bağlı olabilecek sağlık sorunları oluşabileceği, Myomun büyüyebileceği ve bu nedenle bası belirtileri yapabileceği, kötü huylu özelliğe değişebileceği (sarkomatöz dejeneresans), yumurtalıkların muayene veyagörüntülenmesini engelleyerek yumurtalıktaki hastalıklar açısından tanısal gecikmelerinin yaşanabileceği bana anlatıldı.

İŞLEMİN ALTERNATİFİ:

➢ Bazı hormon veya başka ilaçlar kullanmak (gestagenlar, GnRH analogları ya da antagonistleri) ➢ Rahim içerisine hormon salgılayan rahimiçi araç yerleştirilmesi

➢ Rahimin tamamen alınması

➢ Angiografik olarak myom embolizasyonu

AMELİYATIN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan ilaçlara veanestezi işleminin kendisine bağlı olarak birçok risk ortaya çıkabilir. **Bu riskler:**

Akciğerin küçük alanlarında ortaya çıkabilecek sönmelere/çökmelere bağlı olarak artmış akciğer enfeksiyonu riski. Bu durum antibiyotik tedavisi vefizyoterapi gerektirebilir.

Ameliyat pozisyonuna bağlı olarak el veayakta hareket kısıtlılığı vegüçsüzlük (düşük el, düşük ayak) oluşması.

Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu). Bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir veölümcül olabilir. Bu risk özellikle 50 yaş üstü hastalarda daha fazladır.

Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veyafelç.

Anesteziden kaynaklanabilen ölüm.

Kilolu hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.

Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma

Yukarıda belirtilen riskler dışında rahimdemmyomalınması ameliyatı (myomektomi) için özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir:

➢ Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-kusma, ağrı ve ateşle seyreden iltihap (enfeksiyon) gelişebilir

➢ İdrar torbası (mesane) zedelenmesi

➢ Üreter (böbrekten idrar torbasına uzanan tüp) zedelenme riski

➢ İnce ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak barsağın karına ağızlaştırılması (kolostomi) ➢ Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama yada kan toplanmasına (hematom) bağlı o bölgeyi besleyen ana damarların (arteria interna iliaka) bağlanması

➢ Ameliyattan sonra önceden var olmayan idrar kaçırma yakınmasının ortaya çıkması yada var olan yakınmada artış

➢ Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması

➢ Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı

➢ Myom çıkartılması sırasında ortaya çıkanve durdurulamayan kanama sonucu rahimin alınması gerekebilir.

➢ Myom çıkarıldıktan bir süre sonra rahimin aynı ya da başka bölgelerinde tekrarlayabilir. ➢ Rahim içi boşluğundaki tabakanın (endometrium) zedelenmesi ile rahim içi yapışıklıklar gelişebilir ve bu yapışıklıklar adet görme (menstrüasyon) bozuklukları yaratabilir ve/veyagebe kalamama, tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açabilir.

➢ Ameliyat sonrası gelişen karın içi yapışıklıklar ağrı, tüplerin tıkanması, tüp-yumurtalık ilişkisinin bozulması vekısırlığa yol açabilir.

Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden ameliyat edilmesi gerekebilir. Ameliyattan sonra uzun vadede karındaki kesi yerinde sertleşme (skar-keloid), karın duvarında fıtık gelişimi gibi komplikasyonlar görülebilir.

İŞ LE M İN T A H M İNİ S ÜR E S İ: Ameliyatınız bir problem olmadığı sürece tekniğe göre değişmekle beraber yaklaşık **1saat ile 2 saat** arasında gerçekleştirilir.

KULLANILACAK İLAÇLARI ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜM TEHLİKESİ ortayaçıkabilir. Ameliyat öncesinde vesonrasında, tedavi gördüğünüz klinikte verilen ilaçların, ilaca bağlı olarak çok çeşitli toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle ÖLÜMTEHLİKESİ dâhil olmak üzere birçok etki ortaya çıkabilir.

SAĞLIĞINIZ İÇİN KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ:

Sigara, daha kısa ve daha düşük kaliteli bir yaşam süresine neden olur. Sigara içmek, tedavinin/ameliyatın başarısını kötü yönde etkiler. Sigara içen hastalarda anestezi riskleri daha fazladır, anestezi nedeniyle ölüm daha sık görülür. Sigara içiyorsanız, tedavi/ameliyat başarısının genel başarı ortalamasından daha düşük olacağını bilmelisiniz.

GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBİ YARDIMA NASIL ULAŞILABİLECEĞİ:

Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde söz konusu tedaviyi/ameliyatı uygulayabilecek hastanemize/hastanelere kişisel olarak yeniden başvurabilirsiniz.

Ulaşabileceğiniz telefon numarası : ..... / .....

Rahimden Myom Alınma (Myomektomi)Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Düzenli pansuman gerekebilir. Tam iyileşme bir-iki ayı bulabilir.

Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz belirtilecektir. Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık şişlik akıntı geliştiği zaman ya da beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.

İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız. Yara iyileşme sürecinde ve sonrasında hekiminizin uyarıları doğrultusunda ağır kaldırmaktan sakınınız.

Ameliyat sonrası yolunda gitmeyen bir şey mi var :

Ameliyat sonrası dönemde şiddetli bulantı kusma, karın ağrısı, büyük abdestinizi yapamama, gaz çıkaramama, yara yerinde belirgin şişlik, yara yerinde belirgin morluk, yara yerinden aşırı akıntı, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı gibi yakınmalarınız olması durumunda mesai saatleri içinde Kadın Doğum polikliniklerimizden diğer zamanlarda ise hastanemiz acil servisinden tıbbi yardım ve destek alabilirsiniz.

Hastaya Özel Durumlar:

Alerji/Kullanılan İlaçlar: Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgi verdim.Ayrıca doktorumu kullandığım reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar, diyet katkı maddeleri, kullanımı yasadışı ilaçlar, alkol ve uyutucu/uyuşturucular konusunda bilgilendirdim. Doktorum tarafından bu maddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı ve öneriler yapıldı.

HASTA İZNİ

Doktor, tıbbi durumumu ve uygulanacak prosedürleri açıkladı. Uygulanacak işlemlerin risklerini, bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları anladım. Doktor, konu ile ilgili diğer tedavi seçeneklerini ve ilişkili riskleri açıkladı. Doktor, prognozumu ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri de açıkladı. Doktor anestezi risklerini ve anestezi risklerini artıran faktörleri açıkladı. Durumum, riskler, uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı, cevaplandı, memnun ve ikna oldum. Damardan kan verilme ihtiyacı da olabilecek bu prosedürü /ameliyatı anladım. Uygulanacak işlemlerin, uzman doktor tarafından yapılabileceğini anladım. Uygulanan işlemler sırasında gelişebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım. Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım. Tüm bu şartları kabul ederek tedavimin yapılmasını istiyorum.

'İş bu formun bir nüshasını aldım'.

Adı –Soyadı : **Tarih ve saat :**

İmzası :

Hasta yakını (varsa)

Adı – Soyadı : İmzası :

Bilgilendirmeyi Yapan Hekim

Adı – Soyadı : Ünvanı : İmzası :

İşlemi Gerçekleştirecek Hekim

Adı – Soyadı : Ünvanı : İmzası :

Hasta (ya da kanuni temsilcisi)