Hasta Adı, Soyadı:

Sağlık durumunuz / hastanızın sağlık durumu ile ilgili ve size/ hastanıza önerilen tıbbi, cerrahi tedavi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri, sonrasında dikkat edilecek hususlar, hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm bunları ya da bir kısmını reddetmek ya da kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında durdurmak hakkına sahipsiniz. Sizden okuyup, anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır.

Sizin/Hastanız için .....tanısı konulmuş olup..... ameliyatı

Op Dr ..... tarafından yapılacaktır.

Tahmini süresi ..... dır/dir.

Hastalığın Tanımı, Yapılacak Cerrahi İşlem ve İşlemin Faydaları, Kullanılan İlaçlar:

El yada ayakta tırnaklarında yanlış büyüme sonrası çevre yumuşak dokuya batma sonucu şişlik, ağrı, iltihap gibi rahatsızlıkların olmasıdır.

Genellikle sadece parmağın iğne yapılarak lokal anestezi altında ve kanamayı engellemek için parmağın damarlarını sıkan elastik parmak turnikesi yapılarak operayon yapılır. Bazen tırnağın tamamı çekilerek veya çoğunlukla sadece tırnağın batan kısmı tırnak ve tırnak yatağı ile birlikte çıkarılarak batık olan kenardaki iltihaplı yumuşak doku alınarak doku tırnağa dikişle yaklaştırılarak yapılan ameliyatıdır. Ameliyat sonrası turnike açılır. Ameliyat sonrası iltihap için antibiyotik ve ağrı için ağrı kesici kullanılılır. Ameliyat sonrası enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için antibiyotik, ağrı için ağrı kesici kullanılır. Bu ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Alerjilerinizi doktorunuza bildiriniz.

İşlemin Başarı Oranları: %50-95 arasındadır

İşlem Uygulanmazsa; Enfeksiyon gelişebilir veya var olan enfeksiyon yayılabilir, tüm parmağı etkileyebilir. Ağrı artabilir, fiziksel aktivitelerinizi yavaşlatabilir. Ayakkabı giymeyi engeller.

İşlemin Alternatifleri; Ameliyat olmama, enfeksiyon için antibiyotik, ağrı için ağrı kesici ilaçlar, ayakkabı temasını engellemek ve pansuman yara bakımı.

Ameliyatın Riskleri ve Komplikasyonları;

Lokal Anestezi Riskleri: Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum hayati tehlike oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür. Anestezi yaparken damar sinir hasarı oluşabilir. Bu durmda parmakta dolaşım bozukluğu gangren ve parmağın kaybına yol açabilir. Sinir hasarına bağlı parmakta geçici veya kalıcı his kaybı olabilir.

Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek olası riskler, komplikasyonlardır:

√ Parmak şişebilir, bu gerginliğe ve gangrene (doku ölümüne) neden olabilir.

√ İlgili eklemde enfeksiyon gelişebilir. Antibiyotik kullanmak gerekebilir.

√ Tırnak parçası tekrar büyüyebilir ve tekrar ameliyat gerekebilir.

√ Yara iyileşmesi anormal olabilir. Yara, kalınlaşıp kızarabilir.

√ Tırnak batması tekrarlayabilir.

√ Nadir olsa da ameliyat esnasında veya sonrasında ölüm riski mevcuttur. Bu tüm ameliyatlarda olabilecek bir risktir.

√ Kanama olabilir.

Ameliyati Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

√ Ameliyat sonrası yaklaşık 2 hafta ayağınızı yüksekte (kalp seviyesinde) tutmanız, gece yatarken, alttan 1-2 yastıkla desteklemeniz gerekmektedir. Kanama ve şişlik olmasını engeller.

√ Doktorunuzun belirlediği zamanda pansumanlara gidiniz ve dikişlerinizi zamanında (15. gün) aldırınız.

Dikişleriniz olduğu sürece su ile temastan koruyunuz.

√ Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık şişlik akıntı geliştiği zaman ya da beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.

√ Kontrol randevularınızı aksatmayınız.

√ Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız..

√ Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.

√ Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir.

√ Tırnak batmasının tekrarlamaması için, yüksek topuklu ve dar uçlu ayakkabı giyinmekten kaçınınız, Tırnaklarınızı düz kesiniz.

√ Tekrar eden tırnak batması durumunda doktora başvurunuz.

√ Kanama durumunda pansumanı sık değiştiriniz.

√ Gerektiğinde ..... ´den ..... numaralı telefondan **7-24** saat bilgi alabilirsiniz.

Onam Doğrulama: Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih ve Saat:

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin İşlemi yapacak olan Doktorun

Adı, Soyadı, İmzası: Adı, Soyadı, İmzası: