**KRİTİK DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI TARAMA SONUÇ VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU**

**DİKKAT!**

test yapılarak taburcu edilmişse, bu testin doğumdan sonra 24-72 saat içinde tekrar edilmesi gerekir. Bu nedenle Nabız oksimetre testi, çoğu kritik DKH vakasını tespit eder ancak hepsini saptayamayabilir. Çünkü bazı bebeklerde kritik DKH olmasına rağmen doğumdan sonra erken dönemde kan oksijen düzeyi normal olabilir. Kritik olmayan bazı DKH'ler de tarama ile saptanamayabilir. Bebeğiniz testi geçmiş olsa bile şu belirtileri ölçer.

Hastaneden ayrılmadan önce bebeğinize, Kritik Doğuştan Kalp Hastalığı için nabız oksimetre tarama testi yapılmıştır. Bu test, bebeğinizin kalbinde erken tanı ve tedavi gerektiren olası sorunları belirlemek amacıyla yapılan bir tarama testidir.

bebeğinizi doğum yapılan hastaneye tekrar götürmeniz gerekmektedir.

bebeğinizi doğum yapılan hastaneye tekrar götürmeniz gösteriyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun:

**Kritik Doğuştan Kalp Hastalığı Nedir?**

Doğuştan Kalp Hastalığı (DKH), kalbin yapısını veya kan akışını etkileyen ve en sık görülen doğumsal sorundur.

**Sonuç "GEÇTİ" Ne Demektir?**

- Beslenme sırasında çabuk yorulma

Bazı ağır vakalar "kritik" DKH olarak adlandırılır, erken tanı  Sağlıklı bebeklerde hem el hem de ayak ölçümlerinde kan

- Terleme

ve müdahale gerektirir. Doğumdan sonra erken dönemde  oksijen düzeyinin %95-100 arasında olması ve el-ayak

- Hızlı soluk alıp verme

fark edilmeyen hastalıklar ağırlaşabilir ve yaşamı tehdit  arasındaki farkın %3 veya daha az olması normal kabul edilir.

- Dudak ve ağız çevresinde morarma

edebilir.  Test "GEÇTİ" olarak yorumlanır. Bu durum, bebeğinizde ciddi

- Solukluk

**Ne Sıklıkla Görülür?**  kalp hastalığı riskinin düşük olduğunu gösterir.

- Aşırı uyku hali

**Sonuç "KALDI" Ne Demektir?**

Doğuştan kalp hastalıkları, canlı doğan her 1000 bebekten  • Vücutta şişlik

yaklaşık 8-10'unda görülür. Kritik DKH ise tüm DKH'lerin  Bebekte sağ el veya ayak ölçümünde kandaki oksijen  • Huzursuzluk veya zor sakinleşme
yaklaşık %25'ini oluşturur.  düzeyinin %90'dan düşük olması ya da el-ayak arasındaki  • İdrar çıkışının azalması **Nabız Oksimetre Testi Nedir?**  farkın
%3'ten fazla olması anormal kabul edilir. Bebek testi

geçemez; test "KALDI" olarak yorumlanır. Bu durumda,

Nabız oksimetre testi basit, ağrısız ve acısız bir testtir;

doktorlar öncelikle bebeği muayene eder, ardından  **Ayrıntılı bilgi almak için**

kandaki oksijen düzeyini ölçer.

gerektiğinde ekokardiyografi (kalp ultrasonu) gibi ileri  **Doktorunuz veya hemşireniz ile görüşebilirsiniz.**

**Test Bebeğinize Ne Zaman Yapılmalıdır?**  tetkikler yaparak kalp ve kan akışını daha ayrıntılı inceler.  *Bu belge bilgilendirme amaçlı olup, orijinal formun*

Ayrıca oksijen düşüklüğünün nedenini anlamak için farklı  *Word ortamına aktarılmış halidir. Tıbbi tavsiye veya*

Tüm bebeklerin (bazı özel durumlar hariç) hastaneden

testler de uygulanabilir. Doktorunuz, test sonucuna göre size *teşhis yerine geçmez. AI yanıtları hatalar içerebilir.*

taburcu olmadan önce, doğumdan sonra 24-48 saat

yol gösterecektir.

içinde taranması gerekmektedir. Testin yapılabilmesi için

bebeğin en az 24 saatlik olması gerekir. Eğer bebeğiniz

doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde

| | |
|---|---|
| Tarafıma, bebeğimin kritik doğuştan kalp hastalığı tarama sonucu hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirmeyi anladığımı ve önerilen başvurunun tarafımca yapılmasının sorumluluğunun bana ait olduğunu kabul ederim.<br>•<br>**Adı/Soyadı:**<br>•<br>**Yakınlık Derecesi:** Anne/Baba<br>**Tarih:** ...../...../20....<br>**İmza:** | **Bilgilendirmeyi yapan sağlık personeli:**<br>**Adı/Soyadı:**<br>**Tarih:**<br>**İmza:** |

•

•

•