(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ LİSTESİ

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
1	**ADENOZİN 50 MG 10 ML FLAKON**	Açılldıktan ve sulandırıldıktan sonra Hemen kullanılmalıdır.		25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.Yüksek riskli ilaç
2	**ADEPİRON AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	Başka ilaçlarla karıştırılmaz 1 yaşından küçük im yapılır1 yaşından büyük ım/ıv yapabilir 3 aylıktan küçük olanlara yapılmamalıdır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklanır.
3	**ADRENALİN 0, 5 AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	Subkutan enjekte edilir.acil durumlarda ıv yapılır	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalı .yüksek riskli ilaç
4	**AKİNETON AMPUL**	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır	IMveya IV uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklanır.
5	**ALCAİNE DAMLA**	Açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 1 ay saklanabilir.	Sadece topikal kullanılır enjekte edilmemeli veya içilmemelidir.	2-8°c'nın arasında buzdolabında saklanır, ışıktan korunmalıdır.
6	**ALLENİK AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	IMveya IV yapılır 2 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
7	**ALPROSTADİL 500 MG FLAKON**	Açıldıktan sonra buzdolabında 24 saat saklanabilir.	%0, 9 izotonik %5 glikozla seyreltilerek kullanılır.	2-8° muhafaza edilir ışıktan korunmalıdır.
8	**ALTUZAN FLAKON**	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır	%0, 9 izotonikle seyreltilir. IM olarak uygulanır.Flk içeriği beraberindeki enjeksiyonluk su ile sulandırılır.	2-8° buzdolabında saklanır ışıktan korunmalıdır.
9	**AMBİSOME AMPUL**	Açıldıktan sonra kalan kısmı saklanmaz atılmalıdır.	30-60 dk IV olarak verilmelidir.enjeksiyonluk su ile hazırlanır %5 Dextroz ile syretilebilir.	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.Dondurmayınız.
10	**AMİDOVİN AMPUL**	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır	Yalnız hastanelerde IV olarak uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalı .yüksek riskli ilaç
11	**APTAMİL MAMA**	Açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir..	Doğumda itibaren oral beslenme olarak kullanılabilir.	15-25°c ortamda saklanır.
12	**ASİST AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Çocuklarda IM enjeksiyon ile uygulanır Erişkinlerde Im ve IV uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
13	**ATARAX ŞURUP**	Son kullanma tarihine kadar kullanılır.	Oral olarak kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan ve nemden korunmalıdır.
14	**ATROPİN 0, 5AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	IM, IV ve subkutan kullanılır.	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır.yüksek riskli ilaçtır.
15	**ATROVENT İNHALER**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	Nebulizatör cihazı ile inhalasyon şeklinde kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalı

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
16	**AVİJECT AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.	IM ve IV uygulanır	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
17	**B.T ENEMA LAVMAN**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır.		25°c'nın altında oda sıcaklığında korunmalı
18	**BACTROBAN POMAD**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	10 gün süreyle haricen kullanılır	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklanmalıdır
19	**BATIDEX SOLÜSYON**	Açıldıktan sonra sterilitesi bozulmadan kullanılabilir.	Sadece haricen kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
20	**BEHEPTAl AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	IM veya IV şeklinde ışıktan korunarak uygulanmalıdır.	15-30°c arasında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
21	**BENİSON AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Derin IM veya IV kullanılır	15-30°c arasında oda sıcaklığında donmaktan ve ışıktan koruyarak saklayınız.
22	**CALCİUM AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Kristallenme olmuşsa amp.30-40 c ısıtıp kullanılır.%5'lik glikoz yada %0, 9'luk sodyum klörür çözeltisiyle seyretilmelidir.Bikarbonat fosfat veya sülfat içeren seyreltme solüsyonlarının kullanılımından kaçınılmalıdır.Yavaş infüzyon	15-30°c arasında oda sıcaklığında dondurmadan saklayınız.
23	**CALPOL SÜSPANSİYON**	Son kullanım tarihine kadar kullanılır.	Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.	25°c altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
24	**CARENA AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	IV olarak kullanılır.Yavaş infüzyon yapılmalıfır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
25	**CARNİTİNE AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	2-3 dak.yavaş enjeksiyonla veya infüzyon olarak verilir.	25°c altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
26	**CHİROCAİNE AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Tek kuıllanımlıktır .Kullanılmayan kısımları atılmalıdır.	15-30°c arasında oda sıcaklığında saklanır.
27	**CİPROFLOKSASİN FLAKON**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Cipro%0, 9 NaCL, Ringer solüsyon laktat solüsyon %5 ve %10 glikoz solüsyon %0, 45 NaCL ile karıştırıldığında mikrobiyolojik açıdan ve ışıkn duyarlığı açısından hemen kullanılmalıdır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız ışıktan koruyunuz buzdolabında muhafaza etmeyiniz dondurmayınız.
28	**CLEXANE AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	Tek kullanımlık şırıngadır subkutan uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında dondurmadan saklanılır.
29	**COLIMYCİN AMPUL**	Rekonstitüsyon çözeltisi 2-8 c buzdolabında 7 gün saklanır.	Başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
30	**CORDARONE AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmadır	IV yolla uygulanır yavaş infüzyon yapılmalıdır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
31	**COROSURF FLAKON**	Oda sıcaklığına kadar ısıtılmış olan açılmamış flakonlar daha sonra 1 kereye mahsus olarak 24 saat içinde tekrar buzdolobına konabilir oda sıcaklığına kadar ısıtılmış ambalajları bir kereden fazla koymayınız	İlk uygulamadan sonra flakonda kalan kısmı kullanmayınız kullanılmayan kısımları ileride kullanmak için saklamayınız.intratrakeal uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan korunmalıdır.
32	**DEKSAMET 8 MG AMPUL**	Açıldıktan sonra kalan kısmı kullanılmamalıdır.	IM ve IV olarak uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.Donmaktan koruyunuz.
33	**DEMİZOLAM 5 MG VE 15MG AMPUL**	Açıldıktan sonra kalan kısmı kullanılmamalıdır.	IM ve IV olarak uygulanır.	30°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.Donmaktan koruyunuz.
34	**DEPAKİN 200 MG ORAL ÇÖZELTİ**		Ambalaj içindeki dozaj enjektörü kullanılarak uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.Donmaktan koruyunuz.
35	**DESFERAL FLAKON**	Açılan ilacın tamamı kullanılmalıdır	IM, SC ve IV olarak uygulanır	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız.
36	**DİAZEPAM DESİTİN REKTAL**	Tek kullanımlıktır.Tüpte kalan miktar kullanılmaz.	Makattan uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
37	**DİGOXİN AMPUL**	Üründe ve ambalajda bozukluk varsa kullanmayınız	IV olarak yavaş uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
38	**DOBCARD AMPUL**	Hazırlanan çözelti 24 saat içinde kullanılmalıdır.	Iv olarak uygulanır.	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır. Işıktan koruyunuz.Dondurmayınız.
39	**DOPADREN AMPUL**	Hazırlanan çözelti 24 saat içinde kullanılmalıdır.	Seyretilerek ıv olarak uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
40	**DRAMAMİNE AMPUL**	Tek kullanımlıktır.	Im olarak uygulanır.uygun vakalarda ıv olarak uygulanır.	25°C'nin altında oda sıcaklığında nemden ve ışıktan koruyarak saklanır.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
41	EKİPİM FLAKON	Açılan flakonlar oda sıcaklığında 24 saat buzdolabında 7 gün süre ile saklanabilir.	Im veya ıv olarak uygulanır.	25°C'nin altında oda sıcaklığında
42	EMEDUR AMPUL	Açıldıktan sonra kalan kısmı kullanılmaz.	Im olarak uygulanır.	oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak muhafaza ediniz.
43	EPİTOİN AMPUL	Açıldıktan sonra 1 saat içinde uygylanmalıdır.	Iv olarak kuıllanılır	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır. Işıktan koruyunuz.
44	EQİTAX FLAKON	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.	Im veya ıv olarak uygulanır.	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır. Işıktan koruyunuz.
45	ESELAN FLAKON	Çözüldükten sonra oda sıcaklığında 4 saat buzdolabında 12 saat saklanır	Iv olarak uygulanır	25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanır. Işıktan koruyunuz.
46	ESMERON FLAKON	Flakon açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılır	Iv olarak uygulanır	Karanlıkta 2-8°C'de saklanır.
47	FENTANYL AMPUL	Açıldıktan sonra saklanmamalıdır.	Iv olarak genel anestezide kullanılır	15-30°C arasında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
48	FLİXOTİDE NEBUL	Açılmış nebuller buzdolabında saklanmalı ve 12 saat içinde kullanılmalıdır.	Oral inhalasyon içindir.	30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Donmaktan ve direk güneş ışığından koruyunuz.
49	FUCİTHALMİC GÖZ DAMLASI	Kapağı açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.	Göze tatbik edilir.	oda sıcaklığında nemden ve sıcaktan uzak muhafaza ediniz.
50	FUROMİD AMPUL	Açıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır.	Im veya ıv olarak uygulanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
51	GASTRAZOL FLAKON	Çözelti hazırlandıktan sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır.	Sadece ıv olarak kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
52	GELOFUSİNE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ		Çözeltide bulanıklık renk değişikliği varsa ambalajda sızıntı fark edilirse kullanılmaz.önceden açılmış ve kısmen kullanılmış ilaç atılmalıdır, serum setine bağlanmamalıdır	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
53	GENİVİG FLAKON	Tek kullanımlıktır.her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.	Direkt olarak veya %5 glukoz çözeltisi ile seyretilerek ıv olarak kullanılır.	2-8°c arası buzdolabında saklayınız . Nemden ve ışıktan koruyunuz.dondurmayınız.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
54	**GENTA 40 MG AMPUL**	Ampul tek kullanımlıktır.çözelti açılıncahenem kullanılmalıdır.kullanılmayan kısımları atılmalıdır.	Genta enjeksiyonlarda diğer ilaçlarda karıştırılmamalıdır.	30°C arasında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
55	**GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		30°C arasında oda sıcaklığında saklayınız.
56	**GEROFEN SÜSPANSİYON PEDİFEN SÜSPANSİYON**		Kullanmadan önce homojen görünüm elde edilenceye kadar çalkalanmalıdır.	25°C arasında oda sıcaklığında saklanır.
57	**GLUCAGEN HYPOKİT 1 MG FLAKON**	Sulandırıldıktan sonra glucagen hemen kullanılmalıdır.	SC veya ım olarak uygulanır.	25°C arasında oda sıcaklığında saklanır.dondurmayınız.
58	**GLYCOPHOS KONSANTE ÇÖZELTİ**	Açılan flakonlardan arta kalan kısımları atılmalıdır.	Seyretilmeden verilmemelidir.infüzyon süresi 8 saatten kısa olmamalıdır.	30°C.dondurmayınız.
59	**HEPARİN SODYUM 25000 IU FLAKON**	Açıldıktan sonra 24 saat içerisinde kullanılmalıdır	Iv veya SC uygulanır	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
60	**HUMALOG KARTUŞ**	Kartuş kaleme yerleştirildikten sonra28 gün buzdolabında 2-8 c saklanabilir.	Kaleme yerleştirilen kartuşları iğne takılı olarak saklayınız.	Buzdolabında 2-8 c arasında saklayınız donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
61	**HUMAN ALBUMİN %20 ML FLAKON**	İnfüzyon şişesi açıldıktan sonra içerik hemen kullanılmalıdır.	Iv olarak uygulanır.	25°C arasında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak ambalajıyla saklanmalıdır. dondurmayınız donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
62	**HYPERHEP FLAKON**	Enjektör birkez açıldığında hemen kullanılmalıdır.kalan kısımları atılmalıdır.	Bulanık, kalıntı veya partikül içeren çözeltileri kullanmayınız.	2-8°C buzdolabında saklanmalı ürün kesinlikle dondurulmamalıdır.donmuş ürün çözüldükten sonra kullanılmamalıdır.
63	**İESEF 0, 5 GR FLK SEFTRİAKSON 0, 5 GR FLAKON**	Çözeltiler hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Çözeltilerin rengi saklama süresi konsantrasyon kullanılan çözeltiye bağlı olarak açık sarı ile amber rengi arasında değişir.	30°C arasında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
64	**İNSÜLİN PREPARATLARI**	AÇILDIKTAN SONRA 28 GÜN	TEKRAR KULLANIMDAN ÖNCE GİRİŞ YERİ %70 ALKOL İLE TEMİZLENİR VE KURUMASI BEKLENİR.	2-8°c arası buzdolabında saklayınız .Nemden ve ışıktan koruyunuz.dondurmayınız.
65	**İMİPENEM 500 GR FLAKON(CİLAPEM 0, 5 GR FLAKON)**		Cilapem ıv steril toz. Tablodaki gibi hazırlanmalıdır. Berrak bir solüsyon elde edilene kadar çalkalanmalıdır. Rengin sarıya doğru çeşitlilik gösterilmesi ilacın potensini etkilemez.	Kuru toz 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
66	**İZOTONİK NACL SOLÜSYONLARI**	AÇILDIKTAN SONRA 24 SAAT	TEKRAR KULLANILABİLMESİ İÇİN STERİLİTESİ BOZULMAMALIDIR.	ÜZERİNE AÇILIŞ TARİHİ VE SAATİ YAZILIR.
67	**JETOKAİN AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		Oda sıcaklığında 16-25°C arasında saklanmalıdır.16°C altında kristallenme olabilir 25°C üzerinde vazokonstriktör dayanıklığı önemli ölçüde azalır.ışıktan uzak tutulmalıdır . donmaktan korunmalıdır.
68	**KEPPRA 100 MG ORAL SÜSPANSİYON**	Açıldıktan sonra 7 ay25°C'de saklanmalıdır.		25°C arasında oda sıcaklığında saklanır.ışığa hassasiyetten ambalajıyla muhafaza ediniz.
69	**KETALAR FLAKON**	Tek kullanımlıktır her operasyon sonrası artan ürün atılmalıdır.	Oral kullanılır	15-30°C arasında ışıktan koruyarak saklayınız.
70	**KLAMER FLAKON**	AÇILDIKTAN SONRA 14 GÜN	TEKRAR KULLANILABİLMESİ İÇİN STERİLİTESİ BOZULMAMALIDIR.	ODA SICAKLIĞINDA 25 C ALTINDA MUHAFAZA EDİLİR
71	**KLARİTROMİSİN FLAKON**	Sulandırılmış klacid I.V. oda sıcaklığında 24 saat 5°C 'de 48 saat saklanabilir.	İntravenöz klaritromisin infüzyon karışımına çözeltinin kimyasal veya fiziksel stabilesi üzerine etkisi saptanmadan hiçbir ilaç veya kimyasal madde ilavesi yapılmamalıdır.	Açılmış flakonlar 30°C 2nın altında oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.
72	**KLORAMİN 25 MG 70 ML SÜSP.(KLACİD ORAL SÜSPANSİYON KLAMER ORAL SÜSPANSİYON)**	Hazırlanmış süspansiyon 25°C altında 14 gün aktivesini korur.	Ambalaj içinde bulunan saf su granül bulunan süsp. Şişesine iki defada ilave edilir her su eklendiğinde şişe iyice çalkalanır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
73	**KLOVİREKS FLAKON**	Klovireks flakon sulandırıldıktan sonra hemen uygulanacağı parenteral sıvıya katılmalı flakondaki kullanılmış miktar atılmalıdır.	Iv yolla uygulanır	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız
74	**KONAKİON AMPUL (K VİTAMİNİ)**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır	Oral, ım, ıv olarak kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.dondur mayınız.
75	**LANTUS SOLOSTAR KATUŞ**	Kullanımdaki kalemler:kullanılmakta olan kujllanıma hazır dolu enjeksiyon kelemleri veya yedek olarak taşınan kartuşlar maksimum 4 hafta süre ile 25°c'nin altındaki oda sıcaklığında direkt ışıktan ve ısıdan korunmak şartıyla saklanabilir .kullanındaki kalem buzdolabında saklanmamalıdır.bu süreden sonra kullanmayınız.	Hergün aynı saatte alınmalı günde 1 kez.	Kullanılmamış kalemler 2-8°c arası sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız.dondurmayınız.kullanıma hazır dolu kalemleri ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız.
76	**LOKALEN POMAD**			25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
77	**LUMİNALETTEN TABLET**		Oral kullanılır.	25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
78	**MADECASOL POMAD**	Açıldıktan sonra tarih yazarak son kullanma tarihine kadar kullanılır.		25°c'nın altında oda sıcaklığında saklayınız
79	**MAGNEZYUM SULFAD %15 AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Iv yada ım yoluyla uygulanabilir	30°c'nın altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.
80	**MEROPENEM 0.5GR FLAKON**	Açıldıktan sonra çözülmüş ürün hemen kullanlmalıdır.En fazla 24saatte buz dolabında 2-8°c saklanmalıdır.	Açılmış solüsyonun tekrar kullanılbilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	30°c oda sıcaklığında saklayınız.
81	**MİKOSTATİN ORAL SÜSPANSYON NİSTATİN 1000 IV**		Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.	15-30°c arasında oda sıcaklığında saklanır.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
82	**MOTİLİUM 1 MG 200 ML SÜSPANSİYON (DOMPERİDON 1MG)**	Şişe bir kez açıldıktan sonra 3 aydan fazla kullanılmamalıdır.		15-30°c arasında oda sıcaklığında saklanır.
83	**MUCONEX ŞURUP (ASETİLSİSTEİN 202MG)**	Açıldıktan sonra 12gündür.	Şişedeki işaretli yere kadar su doldurulur Ve şişe iyice çalkalanır içerik tamamen çözülmelidir .	25°c altında oda sıcaklığında saklanır.
84	**MYDFRIN GÖZ DAMLASI**	Açıldıktan sonra 15gün içinde kullanılmalıdır.		25°c oda sıcaklığında saklaynız.
85	**NARKOTİKLER**	***KULLANILDIKTAN SONRA KALANI İMHA EDİLMELİDİR.***	KESİNLİKLE TEKRAR KULLANILMAMALIDIR !	
86	**NEOSTİGNE AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		25°c oda sıcaklığında saklaynız.
87	**NOVOPYRINE AMPUL (METAMİZOL AMPUL)**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	.....	25°c oda sıcaklığında saklaynız.
88	**PARASETAMOL FLAKON PAROL FLOKAN**	Açılmış veya seyreltilmiş çözeltileri Kıllanılabilirlik süresi infüzyon süresi dahil 1saatten fazla değildir.	.....	25°c oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.Dondurmayınız buzdolabında saklamayınız .
89	**PENBİSİN 0, 5GR FLK AMPİSİLİN 0, 5GR FLK**	Sulandırıldıktan sonra hemen Kullanılmalıdır.	.....	25 °c'nın altında oda sıcaklıgında saklayınız.
90	**PENİSİLİN 1MİLYON FLAKON**	Açıldıktan sonra hazırlanmış sülüsyonlar önemli aktivite kaybı olmadan 7gün buz dolabında tutulabilir.	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	30°c 'nın altında saklanır.Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
91	**PENTALSODYUM 0, 5 GR FLAKON**	Her bir flakon sadece bir anestezi için Ve bir kullanım içindir.	Sadece berrak çözeltileri kullanılmalıdır.Tam olarak çözülmemiş pental sodyum çözeltiler anestezi için kullanılmalıdır .	25°c 'nın altında Işıktan koruyunuz.oda sıcaklıgında saklayınız.
92	**POLİVİT SÜSPANSIYON**		Aç veya tok alınabilir.	25°c 'nın altında sıcaklıgında saklayınız.
93	**POMADLAR**	AÇILDIKTAN SONRA SON KULLANMA TARİHİNE KADAR	TEKRAR KULLANILABİLMESİ İÇİN STERİLİTESİ BOZULMAMALIDIR. BOZULDUĞUNDAN ŞÜPHE EDİLEN POMAD HASTAYA ÖZEL OLMALIDIR	25°c 'nın altında sıcaklıgında saklayınız.
94	**POTASYUM KLORÜR AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	.....	25°c 'nın altında sıcaklıgında saklayınız.ışıktan koruyunuz.
95	**PREDNOL 20 MG AMPUL**	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.	Özellikle çocuklarda uygulanan etkili en düşük doz ile en kısa sürede yapılmalıdır.	Çocukların ulaşamayacağı yerde oda sıcaklığında ambalajında saklayınız
96	**PRİLOC FLAKON**	AÇILDIKTAN SONRA 24 SAAT	TEKRAR KULLANIMDAN ÖNCE GİRİŞ YERİ %70 ALKOL İLE TEMİZLENİR VE KURUMASI BEKLENİR.	ÜZERİNE AÇILIŞ TARİHİ VE SAATİ YAZILIR.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
97	**PRİMPERAN AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		30ºC oda sıcaklığında saklayınız.
98	**PROPOFOL AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		15-30ºC altında saklayınız. Dondurmayınız.
99	**PULMİCORT NEBULIZOR BUDECORT**	Açılan ampuller 12 saat içinde kullanılmalıdır.		Dik konumda ve ışıktan koruyarak muhafaza edilmelidir. Alüminyum folyo zarfları açıldıktan sonra tek dozluk ampüllerin kullanılmayan kısımları ışıktan korunması için zarflarda muhafaza edilmelidir.
100	**RANİTİDİN (RANİVER) AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.	Raniver %0, 9 NaCL %5 Dekstroz intravenöz infüzyon sıvıları ile geçimlidir.	Açılmayan ilaç 30ºC altında oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.
101	**REFLOR ŞASE**			25ºC altında nemden ve güneş ışığından koruyunuz.
102	**SANDOSTATİN AMPUL**	Açıldıktan sonra kullanım esnasında 2 hafta 30ºC altındaki oda sıcaklığında kalabilir.		Işıktan koruyarak buzdolabında 2-8ºC arasında saklayınız, dondurmayınız.
103	**SEFTAZİDİM 0, 5 GR FLAKON (İESETUM 0, 5 GR FLAKON)**	Seftazidin çözeltisi su ile çözüldüğünde hemen kullanılmayacaksa buzdolabında 24 saat süreyle saklanabilir. Ancak sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılması tercih edilmektedir.	İesetum yaygın olarak kullanılan IV sıvıların çoğu ile geçimlidir. Ancak $NaHCO_3$ enjeksiyon seyreltici olarak tavsiye edilmemektedir. Ürün sulandırıldığında CO_2 açığa çıkar ve pozitif basınç oluşur, sulandırılan solüsyon içinde CO_2 kabarcıkları göz ardı edilebilir.	25ºC altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
104	**SETRON AMPUL**	Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.		25ºC altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız, dondurmayınız.
105	**SULCİD 0, 5 GR FLAKON**	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.		30ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
106	**SULZON 1 GR FLAKON**	Sulandırıldıktan veya seyreltildikten sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma için steril enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. Laktatlı Ringer solüsyonu ile geçimsizdir.	Açılmayan ilaç 25ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

SIRA NO	İLAÇ ADI	KULLANIM SÜRESİ	DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	SAKLAMA KOŞULLARI
107	**SURVANTA İNTRATRAKEAL FLAKON**		İntratrakeal kullanılır.	Açılmayan ilaç buzdolabında 2-8 ºC ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Açıldıktan sonra arta kalan ilaç atılmalıdır.
108	**ŞURUPLAR VE SÜSPANSİYONLAR**	AÇILDIKTAN SONRA SON KULLANMA TARİHİNE KADAR	TEKRAR KULLANILABİLMESİ İÇİN STERİLİTESİ BOZULMAMALIDIR.	25ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
109	**TALCİD SÜSPANSİYON**		Emilim değişikliğini önlemek üzere genelde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.	25ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
110	**TAZOPER 2, 25 GR FLAKON**	Kullanıma hazır çözelti buzdolabında (2-8 ºC) 48 saat oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar.		Açılmayan flakonlar 25ºC altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
111	**TEKOSİT 200 MG FLAKON TEİKOPLANİN 200 MG FLAKON**	Sulandırıldıktan sonra 2-8ºC buzdolabında saklanmalıdır. 24 saatten uzun süre bekletilen solüsyonlar kullanılmamalıdır.		25ºC altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak ambalajında saklanmalıdır.
112	**TRİMOKS PEDİATRİK SÜSPANSİYON**			25ºC altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
113	**URSOFALK SÜSPANSİYON**	Açıldıktan sonra 4 ay saklanır.		25ºC altında oda sıcaklığında saklayınız.
114	**VANCOMYCİN 0, 5 GR FLAKON**	Mikrobiyolojik yönden hemen kullanılmalıdır. Hazırlanan solüsyon kontrol altında 2-8 ºC 24 saatten fazla saklanmaz.	Yavaş infüzyon yapılır.	25ºC altında oda sıcaklığında saklayınız.
115	**ZİNCO ŞURUP**		Tetrasiklinlerle birlikte kullanılmamalıdır. Demir preperatları çinko sülfatın emilimini azaltır.	25ºC altında oda sıcaklığında saklayınız.