Guanfasin, mevcut uyarıcı ilaçların uygun olmadığı ve/veya mevcut ilaçların DEHB

semptomlarını yeterince kontrol altına alamadığı 6-17 yaşındaki çocuk ve ergenlerde ‘dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu’nun (DEHB) tedavisinde kullanılır.Bu ilaç, genellikle psikolojik, eğitimsel veya sosyal tedaviyi içeren bir tedavi programı kapsamında kullanılır.

Aşağıdaki durumlarda bu ilacı almadan önce doktorunuzla görüşün.

• Çocuğunuzun düşük veya yüksek kan basıncı, kalp sorunlarıya da ailenizde kalp sorunu öyküsü varsa

• Çocuğunuz yakın zamanda bayılmışsa

• Çocuğunuzun başka bir psikiyatrik tanısı varsa

• Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandı ise ya da alma ihtimali varsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bazı hastalarda, çok nadir de olsa, ilaçların istenen etkileri yanında istenmeyen yan etkileri de

ortayaçıkabilmektedir. Bu gruptaki ilaçlar ile görülebilecek yan etkiler:

• Uykululuk, baş dönmesi, yorgunluk hissi, güçsüzlük

• Baş ağrısı

• karın ağrısı, bulantı, kilo alımı

• Ağız kuruluğu, kabızlık

• Tansiyon düşmesi

• Ritim bozukluğu (nadir)

• Yüksek dozlarda sersemlik hali, uykuya eğilim, kalp atım hızının yavaşlaması, tansiyon düşüklüğü

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz ilacın çocuğunuz için güvenli ve faydalı

olup olmadığını kontrol edecektir. Çocuğunuz bu ilacı aldığı süre boyunca, ilk kullanımda ve doz ayarlamalarından sonra haftalık olarak, ilk yıl boyunca en az 3 ayda bir ve daha sonra en az yılda iki kez olmak üzere doktorunuz bu kontrolleri tekrarlayacaktır. Bu kontroller aşağıdakileri kapsayabilir:

• Kan basıncı, kalp atım hızı ve gerekli görülürse kalple ilgili diğer kontroller,

• Tedaviye verilen yanıt ve özellikle uyku ve uyuşukluk durumu

• Çocuğunuz boyu ve kilosu.

Hastanın psikiyatrik sorununun tedavisinin ilaç kullanılarak yapılmasının tıbbi yönden gerekli olduğu, tıbbi

ya da yasal engel olmadıkça hastamın tedavisinde değişiklik isteyebileceğim, bu tedaviyi kabul etmezsem

hastalığının kötüleşebileceği, tedavi süresinin uzayabileceği, kendisi ve çevresi için tehlikeli olabileceği bana anlatıldı. İlaçlarla birlikte ek ilaç kullanılması gereken durumlarda doktoruma danışmam gerektiği belirtildi.

Yukarda ilaçlarla ilgili tüm bilgileri okudum ve anladım. Gerekli olan yerlerde doktorumdan yeterli sözel

açıklamaları öğrendim. Her ilaç için beklenmeyen yan etkilerin görülebileceği konusunda bilgilendirildim. Çocuğumun ruhsal bozukluğunun tedavisi amacıyla yukarıda bahsi geçen ilaçları kullanmasını serbest irademle kabul ediyorum.

Hastanın adı soyadı:

Hastane protokol no:

Tarih:

Hastanın Vasisinin adı soyadı: Klinik Sorumlu Hekim Yakınlık derecesi: Adı Soyadı:

İmza İmza