HASTANIN ADI-SOYADI: TARİH:
PROTOKOLÜ: DOKTOR:

Sayın Hastamız / Hasta Vasi, Veli veya Yakını;

Bu form sizi/ hastanızı tedirgin etmek için değil, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu formu imzalamakla siz tüm sorumluluğu almış olmadığınız gibi anestezistin sorumluluğu da ortadan kalkmış olmayacaktır. Ameliyat olabilmeniz için sizlere anestezi vermek bizlerin asli vasifesidir. Ancak bu işlemi izniniz olmadan ve sizleri bilgilendirmeden Türk Ceza Kanunun ve Mesleki Yönetmeliklerimize göre gerçekleştiremiyoruz. Eğer bilgilendirme formunu okumak istemiyorsanız konu edilen bilgileri okumak istemediğinizi ve yapılacak her türlü işleme onay verdiğinizi okunaklı bir biçimde el yazısı ile yazarak imzalayınız. Bu sizin bilgi almama hakkınızdır.

YAPILACAK OLAN İŞLEM:ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ

Uygulanacak cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz, ağrı duymamanız ve hatırlamamanız için size, anestezi uygulayacağız. Genel anestezi hastanın işlem boyunca tamamen uyutulması demektir. Bu form sadece bilgilendirmek ve yapılacak işlemler için izninizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Size ameliyat öncesi ameliyata hazırlık amacıyla bir gün önceki gece ve ameliyat alınmadan önce, anestezistiniz uygun görürse bir ilaç verilecektir. Bu ilaç, ağız kuruluğu, geçici unutkanlık ve uyku hali yapabilir. Daha sonra ameliyat salonuna alınacaksınız. Bu sırada:

Kalbinizin durumunu değerlendirmek için vücudunuza EKG elektrotları bağlanacak. Serum takılması amacıyla damarınıza özel bir iğne yerleştirilecek. Parmağınıza, kanın oksijenlenmesini gösteren küçük bir cihaz takılacak. Kolunuza tansiyon aleti bağlanarak tansiyonunuz ölçülecek. Bunların dışında anestezistiniz uygun göreceği özel uygulamalar yapabilir. Eğer yapılacaksa bu uygulamalar için size detaylı bilgi verilecektir.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR: Uygulanacak cerrahi işlem süresince hastanın yapılanları hissetmemesi ve ağrı duymayarak rahat etmesinin sağlanması

A-GENEL ANESTEZİ (NARKOZ) Damarınıza takılan iğneden verilecek ilaçlarla veya maskeden solutulacak oksijen ve anestezik gaz ile uyumanız sağlanacak, gerekirse ilaçlarla solunumunuz durdurularak aletler yardımıyla kontrol edilecektir. Bu işlemleri hatırlamayacaksınız. Solunum kontrolü için gerekli görülürse soluk borunuza takılacak bir tüp ile oksijen ve anestezik gaz verilmeye devam edilecektir.Tam uyku hali nedeniyle psikolojik yükü azdır.Komplikasyonlarda solunum yolu güvence altındadır.Etkisini cok hızlı gösterir. Bu işlemlerden sonra ameliyata başlanmasına izin verilecektir.

B-BÖLGESEL ANESTEZİ Anestezi korkusu olan hastalarda işlem boyunca uyanık kalarak yapılan bölgesel anestezide operasyonun yapılacağı yere göre belinizden, koltuk altınızdan, boynunuzdan, bacaktan veya kasığınızdan bir iğne ile ilaç verilecekvücudunuzun o bölümü uyuşturulacaktır. Spinal anestezide bel bölgenizde, omurlar arasındaki bulunan beyin omurilik sıvısının içinde bulunduğu bölgeye, ince bir iğne ile uyuşturucu madde verilerek belden alt kısımda ağrı, his duyusu ve hareketin ortadan kaldırıldığı anestezi uygulamasıdır. Bu durumda uygulanacak cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz ve ağrı duymamamızı sağlayacaktır.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR: Yapılacak ameliyat işlem gerçekleştirilemez.

VAR İSE İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ: Her operasyon için yapılan tetkik ve konsultasyon sonrası anestezi uzmanının belirlediği ve hastanın onayı alınarak uygun anestezi seçilir.(genel – bölgesel anestezi gibi)

İŞLEMİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI: (Aşağıda anlatılan risklerin gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür.) Operasyona alınacak hastanın ameliyathaneye girişinden, ameliyat sonrası dönemde dahil mevcut kalp akciğer sistem hastalıkları nedeniyle yada cerrahi ve anestezi stresine bağlı nedenlerle myokard infarktüsü (kalp krizi) geçirebilir. Anestezik ilaçlara bağlı olarak anaflaksi (alerjik reaksiyon), Kardiak arrest (kalp durması) gelişebilir, tedaviye cevap vermeyip kaybedilebilir. Anestezinin başlangıç döneminde çene çıkabilir, dişler ve protezler kırılabilir. Anestezik ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer harabiyeti, kalp yetmezliği, akciğer ödemi görülebilir. Ameliyatın türüne bağlı olabileceği gibi hastanın mevcut hastalıklarına, kilosuna, kullandığı ilaçlara, yaşına bağlı olarak yağ, pıhtı, hava embolisi gelişebilir ve sonuçta felç ve ölüm görülebilir. Çok nadir olmakla birlikte hastanın tetkik edilemeyen özelliğine bağlı ve bazı anestezik ilaçlarla tetiklenebilen çok yüksek ateşle başlayıp ölüme sebebiyet veren hipertermi (ateş yükselmesi) görülebilir. Hamilelikte anestezi bebek için risklidir. Omurilik içine yapılan bölgesel anestezilerde (epidural, spinal, caudal) enfeksiyon, baş ağrısı, kısmi felç, yüz felci gelişebilir. Kalp yetmezliği gelişebilir. Sinir çevresine yapılan bölgesel anestezilerde, duyu kaybı, kısmi felç gelişebilir. Solunum desteği için takılan tüp nedeniyle dudak, ağız, dil, boğaz, soluk borusu, akciğerler zarar görebilir. Tüp çıkarıldıktan sonra geçici boğaz ağrısı ses kısıklığı, yutma zorluğu olabilir.
İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ: İşlemin süresi yapılan ameliyata göre değişiklik göstermektedir.
HASTANIN SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ:

•Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
•İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız.
•Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz belirtilecektir.
GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBİ YARDIMA NASIL ULAŞABİLECEĞİ: Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında doktorunuzla görüşünüz. Hastanemiz iletişim numaraları:0123 456 7890
KULLANILACAK İLAÇLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Cerrahi işlemlerde kullanılabilecek ilaç gruplarının önemli özelliklerinin aşağıda gösterilmiştir;

Anestezik İlaçlar: Bütün duyu çeşitlerini içine almış olarak duyunun algılamasını ortadan kaldıran maddelerdir. Hastanın ameliyat esnasında suur kaybını sağlayan ve uyku halininin devamlılığını sağlayan ilaçlardır.	**Antipiretikler:** Hastalık yada hastalıkların belirtilerinden dolayı ortaya çıkan alıcının yaraına olan ateşi düşürmek amacıyla kullanılan ilaç grubudur.	**İnsülinler:** Vücutta üretilen insülinin azlığı yada tamamen durması sonucu kan şekeri düzeyinin normal sınırlarda tutmak için dışarıdan SC yolla verilen ilaçlardır.
İnhalerler: Solunumu daha iyi bir hale getirmek için solunum yolundaki kasları gevşeten ilaçlardır. (astım belirtilerini ortadan kaldırmak gibi...)	**Kortikosteroidler:** Romatizmal hastalıkların ve romatizma dışı pekçok hastalığın tedavisinde de çok geniş kullanıma sahiptir. Güçlü bir antiinflamatuar ve immündilatör etki gösterir	**Antiemetikler:** Kusmayı önlemek amacı ile kullanılan ilaçlardır. Oral yoldan alınamadığı durumlarda parenteral ve ya rektal yolla verilirler.
Betalaktamlar: Bakterisidel (Mikroorganizmaları öldürücü) etki gösteren bu antimikrobiyaller orta ve ağır derecedeki enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır	**Antihipertansifler:** Kan damarlarını genişleterek başka deyişle daralmasını ve büzülmesini önleyerek ve kalbin iş yükünü azaltarak kan basıncını düşürürler	**Serumlar:** Bazıları elektrolit ihtiva etmemekle beraber geneli sıvı kaybı yerine konmasındavücudun sıvı elektrolit düzeyinin düzeltilmesinde kullanılır.
Bronkodilatörler: Bronş ve bronşiyolleri genişleten ilaçlardır. (Nefes almayı kolaylaştırırlar)	**Antianemikler:** Meydana gelen kansızlık probleminidüzeltmek veya en aza indirmek için kullanılan demir yüklü preparatlardır.	**1. Kuşak Sefalosporinler:** Hastaya anestezi indüksiyonu sırasında yada ameliyattan en az 60 dakika önce verilen hastada oluşabilecek cerrahi alan enfeksiyonlarına karşı koruyan ilaç topluluğudur.
Antikoagülanlar: Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır.	**Antihistaminikler:** Allerjiyi ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardır.	
Analjezikler: Hastalık ya da hastalık belirtilerinden kaynaklanan ağrıları (fizyolojik sistemleri yada patolojik durumları) alıcının yararına genel durumu hafifletmek amacı ile kullanılan ilaçlardır. Şuursuzluk yapmadan ağrıyı azaltırlar.	**Narkotik analjezikler** Ameliyat sonrasında yada son evre CA ağrılarının giderilmesinde kontrollü bir şekilde kullanılan hasta ve hasta yakınlarının ulaşamayacağı kilitli dolap altında tutulan ilaçlardır.Merkezi sinir sistemini uyuştururlar.	**Lokal Aneztezikler:** Bu ilaçlar spinal aneztezi yada epidural aneztezide hastanın ağrı duymasını engelleyen ve harektlerini kısıtlayan ilaçlardır. Ancak dokunma hissini ortadan kaldıramazlar. Hastanın ameliyat bölgesi ve cevresinin agrı hıssi ortadan kalkar.

Üsteki Açıklamalar Doğrultusunda Doktorumun Bana Anlattığı; Alternatif tedavi yöntemlerini ve bunların risklerini biliyorum. Yapılacak olan işlemin risk ve yan etki komplikasyonlarını biliyorum. Başarı olasılığını biliyorum. Tedavi olmadığımda neler olabileceğini biliyorum. Bana söylenenlerin tümünü anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Aydınlatılmış onam formunun anlamını biliyorum. Bana müdahale yapacak kişileri biliyorum. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Yapılacak olan işlemi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

***(Hasta/ hasta yakını tarafından'' okudum, anladım ve her türlü girişimsel uygulamayı kabul ediyorum'' kendi el yazısı ile yazıp imzalaması gerekmektedir.)

.....
.....

İŞLEMİ YAPAN DOKTOR ADI SOYADI:	ONAY ALINAN TARİH:	Hastanın Adı Soyadı İmza	Hasta Yakınının Adı Soyadı İmza	Şahit Adı Soyadı İmza
ÜNVAN:	ONAY ALINAN SAAT:			
İMZA / KAŞE				