EMZİRME-SÜT VERME DÖNEMİNDE KULLANILAMAYCAK İLAÇLAR

METOKREKSAT
NİKOTİN
FENSİKLİDİN
İZOTRETİNOİN
MARİHUANA
SİKLOSPORİN
HEROİN
LİTYUM
AMİADARON
AMFETAMİNLERİN
BROMOKRİPTİN
KOKAİN
SİKLOFOSFAMİD
DOKSORUBİSİN
ERGOTAMİN

EMZİRME-SÜT VERME DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK İLAÇLAR

ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER	PARASETAMOL, İBUPROFEN, ASETİLSALSİLİK ASİT
ANTİBİYOTİKLER	PENİSİLİNİER, SEFALOSPORİNLER, ERİTROMİSİN
ANTİKOAGÜLANLAR	HEPARİN, WARFARİN
BRONKODİLATÖRLER	SALBUTAMOL (İNH)
LAKSATİFLER	KİTLE OLUŞTURUCULAR, SENNA, PSYLİUM, DOKUSAT
ANTİHİPERTANSİFLER	ACE-İ, CA KANAL BLOKERLERİ
KORTİKOSTEROİDLER	PREDNİZON
ANTİDİABETİKLER	İNSÜLİN, TOLBUTAMİD
BESİN TAKVİYELERİ	DEMİR, FOLİK ASİT, VİTAMİN B-C ANTİEMETİKLER, ANTİASİDLER,DİGOKSİN, TİROKSİN, KROMOGLİKAT, PROGESTERON