Adrenalin (0.01 mg/kg, 1:1000 ten im) max.doz 0.3 mg'dır)

Pozisyon verilir. (Ayaklar yükseltilir)
Oksijen başla.

Antihistaminik tedavisi;
Difenhidramin, *H1 bloker* (1 mg/kg)
Ranitidine, *H2 bloker* (1 mg/kg)

Kortikosteroid tedavisi;
Metil prednizolon 1-2 mg/kg 4x1

Sıvı tedavisi;
30 cc/kg Serum Fizyolojik 1 saat içinde infüzyon (ilk 5 dk içinde 1/3' ünü ver, geriye kalan 2/3' lük kısmı ise 55 dk içinde verilecek.)

Hışıltı varsa

B2 agonist tedavisi başlanabilir.

Adrenalin ve B2 agoniste yanıt vermeyen hışıltıda;

Aminofilin uygulamasını düşün!(Bronkodilatatör, (+) introp ve venodilatatör olarak)

Hasta hipotansif ise;

Dopamin infüzyonu (2-20 mikrogram/kg/dk)

Adrenalin infüzyonu (0.1 mikrogram/kg/dk)

Gerekiyorsa ;
Mekanik ventilasyon
Yoğun bakım konsültasyonu
Yatış/sevk