(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Tarih/ Risk Değerlendirme Tarihi:		**Hastanın Yaşı:**	
Hastanın Adı Soyadı:		**Servis Adı:**	

Değerlendirme Gerekçesi	**1.İlk değerlendirme 2.post op dönem 3.Hasta Düşmesi 4.Bölüm değişikliği 5.Durum Değişikliği**		**İlk Değerlendirme**	**Yeniden Değerlendirme (Tarih-Gerekçe Numarası)**				
Parametreler	**Risk Faktörleri**	**Puan**	.../.../20.. ()	.../.../20.. ()	.../.../20.. ()	.../.../20.. ()	.../.../20.. ()	.../.../20.. ()
YAŞ	0-3 yaş	4	4	4	4	4	4	4
	4-7 yaş	3	3	3	3	3	3	3
	8-11 yaş	2	2	2	2	2	2	2
	12-18 yaş	1	1	1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.	2	2	2	2	2	2	2
HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge Bozukluğu, Kooperasyon Bozukluğu, Solunum Hastalıkları, Senkop/Baş Dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.	1	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.	2	2	2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)	2	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.	10	10	10	10	10	10	10
İLAÇ (Hiptonik, Barbitürat, Nöroleptik, Antidepresan, Sedatif, Antihipertansif)	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.	2	2	2	2	2	2	2
EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Katater, Dren vb.)	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.	2	2	2	2	2	2	2
YÜRÜME VE DENGE (Yürüteç, Koltuk Değneği, Kişi Desteği vb.)	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.	10	10	10	10	10	10	10
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde	3	3	3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde	1	1	1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb.)	3	3	3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil	3	3	3	3	3	3	3
DİĞER	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	2	2	2	2	2	2	2
	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.	2	2	2	2	2	2	2
RİSK BELİRLEME TABLOSU	TOPLAM PUAN							
Düşük Risk 0-9 Arası, Yüksek Risk 10 Puan ve üzeri	Değerlendirmeyi Yapan Hemşire Adı Soyadı: İmza:							

NOT:

***Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.**

***Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.**

***Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Riski Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.**