(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
BASI YARASI TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU

HASTANIN ADI SOYADI					PUAN 1.izlem	2.izlem	3.izlem	4.izlem
DUYUSAL ALGI Basınç ya da rahatsız edici durumları algılama	1.TAMAMEN CEVAPSIZ; Bilinç düzeyinde değişiklik veya sedasyon nedeniyle ağrılı uyaranlara (yakalama inleme çekme vb.) cevabın olmaması veya tüm vücutta ağrıyı hissetmede sınırlı	2.SADECE AĞRILI UYARANLARA ÇOK SINIRLI CEVAP; Rahatsızlığı dile getirememe, yalnızca inleme/huzursuzluk ile ifade edebilme veya vücudun yarısındaki ağrı/rahatsızlığı hissetme	3.SÖZLÜ KOMUTLARA KISMEN CEVAP; Rahatsızlık veya dönme isteğini dile getirememe ya da 1-2 extremitede rahatsızlık veya ağrı hissetmede sınırlılık	4.NORMAL SÖZEL CEVAP; Sözel komutları algılama, ağrı, rahatsızlığını dile getirmede sorun				
NEMLİLİK Derideki nemin derecesi	1.TAMAMEN NEMLİ Ter veya idrarla derinin sürekli nemli olması; Hasta çevrilirken, taşırken vücudu kurulanmalı	2.ÇOK NEMLİ Deri sıklıkla nemli fakat her zaman değil; Çarşaf her şifte bir kez değiştirilmeli	3.ARA SIRA NEMLİ Deri Ara sıra nemli; Günde bir kez ekstra çarşaf değiştirmek gerekir.	4.NADİREN NEMLİ Deri genelde kuru; Rutin aralarla çarşaf değiştirilmeli				
AKTİVİTE Fiziksel faaliyet derecesi	**1.YATAĞA BAĞIMLI** Sürekli yatakta	**2.TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI** **Yürüme sınırlı/yok. Kendini Kaldıramıyor ve/veya sandalye yardımla oturuyor.**	**3.ARALIKLI YÜRÜYOR** Gün boyunca ara sıra kısa aralarla yardımla/yardımsız yürüyor. Zamanın çoğunu yatakta/ sandalyede geçiriyor	**4.SIK YÜRÜYOR.** Oda içinde dışında günde en az iki kez veya 2 saatte bir yürüyor				
HAREKET **Pozisyon değiştirme derecesi**	**1.TAMAMEN HAREKETSİZ** **Yardımsız pozisyon değiştiremiyor**	**2.ÇOK SINIRLI** **Vücuduna extremitelerine sınırlı olarak bağımsız pozisyon değiştirebiliyor.**	**3.HAFİF SINIRLI** **Vücudunun veya extremitelerinin pozisyonunu sık sık**	**4.SINIR YOK** **Yardım olmadan her türlü pozisyonu alabiliyor**				
BESLENME **Yiyecek alımı**	**1.ÇOK ZAYIF** **Asla yemeğin tamamını almıyor. Nadiren yemeğin yarısını yiyor. Günde 2 porsiyon dan az protein alıyor. Sıvı az alıyor. Destekleyici sıvı diyet almıyor. Veya NPO/IV ile 5 gün den fazla besleniyor**	**2.MUHTEMELEN YETERSİZ** **Nadiren sunulan yemeğin tamamını yiyor, genellikle yarısını yiyor. Yalnızca günde 3 porsiyon protein alıyor. Genelde verilen diyeti alıyor. Veya IV sıvı, diyet/tüple besleniyor**	**3.YETERLİ BESLENİYOR** **Sunulan 4 porsiyon proteini alıyor.** **Veya beslenme ihtiyacı TPN/ tüple ile karşılanıyor.**	**4.MÜKEMMEL** **Sunulan her Yemeği alıyor**				

SÜRTÜNME VE YIRTILMA	**1.PROBLEM** **Taşınırken yardıma ihtiyacı var. Çarşafla taşınabiliyor. Spastisite, kontraktür ve ajitasyon sürtünmeye neden oluyor.**	**2.OLASI PROBLEM** **Taşınırken az yardıma ihtiyacı var. Yatak veya sandal yede iyi pozisyon alabiliyor**	**3.SORUN YOK** **Yatakta sandalyede bağımsız olarak Hareket edebiliyor, iyi pozisyonlar alabiliyor**					
CİLT TANILAMA	**1. SOLGUN, SİYANOZ, TERLİ**	**2. HAFİF KIZARIK, KURU**	**3. NORMAL CİLT RENGİ**					
TOPLAM PUAN								

75 yaş üzerindeki bireylerde 15-16 puan 15-18 puan)= DÜŞÜK RİSK (haftada 1 ziyaret) 13-14 puan= ORTA RİSK (haftada 2 ziyaret) 12 veya daha az puan= YÜKSEK RİSK(haftada 3 gün)



TARİH		...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....
Toplam Risk Puanı														
Yara Boyu	**Uzunluk (cm)**													
	Genişlik (cm)													
Çevre Cildin Durumu														
Kullanılan Yara Bakım Ürünü														
Yaranın Genel Durumu														
Bakımı Yapan İmza														